

PCT

WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM  
Internationales BüroINTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE  
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation <sup>7</sup> :  C07D 401/12, 401/04, 403/04, 417/04, 403/12, A61K 31/505, 31/506, A61P 9/10, 13/12, 11/00		A1	(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 00/09496  (43) Internationales Veröffentlichungsdatum: 24. Februar 2000 (24.02.00)
<p>(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP99/05636</p> <p>(22) Internationales Anmeldedatum: 4. August 1999 (04.08.99)</p> <p>(30) Prioritätsdaten: 198 36 697.3 13. August 1998 (13.08.98) DE</p> <p>(71) Anmelder (<i>für alle Bestimmungsstaaten ausser US</i>): AVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND GMBH [DE/DE]; D-65926 Frankfurt am Main (DE).</p> <p>(72) Erfinder; und</p> <p>(75) Erfinder/Anmelder (<i>nur für US</i>): SCHINDLER, Ursula [DE/DE]; Robert-Stoltz-Strasse 56, D-65812 Bad Soden (DE), SCHÖNAFINGER, Karl [DE/DE]; Holunderweg 8, D-63755 Alzenau (DE), STROBEL, Hartmut [DE/DE]; Erlenweg 22, D-65835 Liederbach (DE).</p>		<p>(81) Bestimmungsstaaten: AE, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CR, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW, ARIPO Patent (GH, GM, KE, LS, MW, SD, SL, SZ, UG, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).</p> <p>Veröffentlicht <i>Mit internationalem Recherchenbericht. Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist; Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen eintreffen.</i></p>	
<p>(54) Title: SUBSTITUTED 4-AMINO-2-ARYL-PYRIMIDINES, THEIR PRODUCTION AND USE AND PHARMACEUTICAL PREPARATIONS CONTAINING SAME</p> <p>(54) Bezeichnung: SUBSTITUIERTE 4-AMINO-2-ARYL-PYRIMIDINE, IHRE HERSTELLUNG, IHRE VERWENDUNG UND SIE ENTHALTENDE PHARMAZEUTISCHE PRÄPARATE</p>			
<p style="text-align: center;">  (I)         </p>			
<p>(57) Abstract</p> <p>The invention relates to compounds of formula (I) in which R<sup>1</sup>, R<sup>2</sup>, R<sup>3</sup> and R<sup>4</sup> have the meanings given in the claims. Said compounds are valuable active ingredients for the treatment and prophylaxis of diseases, for example cardiovascular diseases such as hypertension, angina pectoris, heart failure, thrombosis and atherosclerosis. The compounds of formula (I) are able to modulate the body's production of cyclic guanosine monophosphate (cGMP) and are generally suitable for the treatment and prophylaxis of disorders associated with impaired cGMP balance. The invention further relates to methods for producing compounds of formula (I), their use in the treatment and prophylaxis of the above diseases and in the preparation of medicaments for such diseases, and to pharmaceutical preparations containing the compounds of formula (I).</p>			

(57) Zusammenfassung

Die vorliegende Erfindung betrifft Verbindungen der Formel (I), in der R<sup>1</sup>, R<sup>2</sup>, R<sup>3</sup> und R<sup>4</sup> die in den Ansprüchen angegebenen Bedeutungen haben, die wertvolle Arzneimittelwirkstoffe für die Therapie und Prophylaxe von Krankheiten sind, zum Beispiel von Herz-Kreislauferkrankungen wie Bluthochdruck, Angina pectoris, Herzinsuffizienz, Thrombosen oder Atherosklerose. Die Verbindungen der Formel (I) haben die Fähigkeit zur Modulation der körpereigenen Produktion von cyclischem Guanosinmonophosphat (cGMP) und eignen sich generell zur Therapie und Prophylaxe von Krankheitszuständen, die mit einem gestörten cGMP-Haushalt verbunden sind. Die Erfindung betrifft weiterhin Verfahren zur Herstellung von Verbindungen der Formel (I), ihre Verwendung zur Therapie und Prophylaxe der bezeichneten Krankheitszustände und zur Herstellung von Arzneimitteln dafür, sowie pharmazeutische Präparate, die Verbindungen der Formel (I) enthalten.

**LEDIGLICH ZUR INFORMATION**


Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
AT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
AU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
AZ	Aserbaidschhan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland	ML	Mali	TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	MN	Mongolei	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	IE	Irland	MR	Mauretanien	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MW	Malawi	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MX	Mexiko	US	Vereinigte Staaten von Amerika
CA	Kanada	IT	Italien	NE	Niger	UZ	Usbekistan
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NL	Niederlande	VN	Vietnam
CG	Kongo	KE	Kenia	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NZ	Neuseeland	ZW	Zimbabwe
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	PL	Polen		
CM	Kamerun	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CN	China	KZ	Kasachstan	RO	Rumänien		
CU	Kuba	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
CZ	Tschechische Republik	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		
DE	Deutschland	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
DK	Dänemark	LR	Liberia	SG	Singapur		

Substituierte 4-Amino-2-aryl-pyrimidine, ihre Herstellung, ihre Verwendung und sie enthaltende pharmazeutische Präparate

5

Die vorliegende Erfindung betrifft Verbindungen der Formel I.



10 in der R<sup>1</sup>, R<sup>2</sup>, R<sup>3</sup> und R<sup>4</sup> die unten angegebenen Bedeutungen haben, die wertvolle Arzneimittelwirkstoffe für die Therapie und Prophylaxe von Krankheiten sind, zum Beispiel von Herz-Kreislauferkrankungen wie Bluthochdruck, Angina pectoris, Herzinsuffizienz, Thrombosen oder Atherosklerose. Die Verbindungen der Formel I haben die Fähigkeit zur Modulation der körpereigenen Produktion von cyclischem  
15 Guanosinmonophosphat (cGMP) und eignen sich generell zur Therapie und Prophylaxe von Krankheitszuständen, die mit einem gestörten cGMP-Haushalt verbunden sind. Die Erfindung betrifft weiterhin Verfahren zur Herstellung von Verbindungen der Formel I, ihre Verwendung zur Therapie und Prophylaxe der bezeichneten Krankheitszustände und zur Herstellung von Arzneimitteln dafür,  
20 sowie pharmazeutische Präparate, die Verbindungen der Formel I enthalten.

cGMP ist ein wichtiger intrazellulärer Botenstoff, der über die Modulation cGMP-abhängiger Proteinkinasen, Phosphodiesterasen und Ionenkanäle eine Reihe von pharmakologischen Effekten auslöst. Beispiele sind die Glattmuskelrelaxation, die  
25 Inhibition der Thrombozytenaktivierung und die Hemmung der Glattmuskelzellproliferation und Leukozytenadhäsion. cGMP wird durch partikuläre und lösliche Guanylatcyclasen als Antwort auf eine Reihe extrazellulärer und

intrazellulärer Stimuli produziert. Im Falle der partikulären Guanylatcyclasen erfolgt die Stimulation im wesentlichen durch peptidische Signalstoffe, wie dem atrialen natriuretischen Peptid oder dem cerebralen natriuretischen Peptid. Die löslichen Guanylatcyclasen (sGC), bei denen es sich um cytosolische, heterodimere

5 Hämproteine handelt, werden dagegen im wesentlichen durch eine Familie niedermolekularer, enzymatisch gebildeter Faktoren reguliert. Wichtigstes Stimulans ist das Stickstoffmonoxid (NO) oder eine nahe verwandte Spezies. Die Bedeutung anderer Faktoren wie Kohlenmonoxid oder dem Hydroxylradikal ist noch weitgehend ungeklärt. Als Aktivierungsmechanismus der Aktivierung durch NO wird die

10 Anbindung von NO an das Häm unter Ausbildung eines pentakoordinierten Häm-Nitrosyl-Komplexes diskutiert. Die damit verbundene Freisetzung des im Basal-Zustand an das Eisen gebundenen Histidins überführt das Enzym in die aktivierte Konformation.

15 Aktive lösliche Guanylatcyclasen setzen sich aus je einer  $\alpha$ - und einer  $\beta$ -Untereinheit zusammen. Von den Untereinheiten wurden mehrere Subtypen beschrieben, die sich untereinander bezüglich Sequenz, gewebespezifischer Verteilung und Expression in verschiedenen Entwicklungsstadien unterscheiden. Die Subtypen  $\alpha_1$  und  $\beta_1$  werden hauptsächlich in Gehirn und Lunge exprimiert, während

20  $\beta_2$  vor allem in Leber und Niere gefunden wird. In humanem fötalen Gehirn konnte der Subtyp  $\alpha_2$  nachgewiesen werden. Die als  $\alpha_3$  und  $\beta_3$  bezeichneten Untereinheiten wurden aus menschlichem Gehirn isoliert und sind homolog zu  $\alpha_1$  und  $\beta_1$ . Neuere Arbeiten weisen auf eine  $\alpha_2$ -Untereinheit hin, die ein Insert in der katalytischen Domäne enthält. Alle Untereinheiten zeigen große Homologien im Bereich der

25 katalytischen Domäne. Die Enzyme enthalten vermutlich ein Häm pro Heterodimer, das über  $\beta_1$ -Cys-78 und/oder  $\beta_1$ -His-105 gebunden ist und Teil des regulatorischen Zentrums ist.

Unter pathologischen Bedingungen kann die Bildung Guanylatcyclase-aktivierender

30 Faktoren vermindert sein oder es kann durch das vermehrte Auftreten freier

Radikale ein verstärkter Abbau derselben erfolgen. Die daraus resultierende verminderte Aktivierung der sGC führt über die Abschwächung der jeweiligen cGMP-vermittelten Zellantwort beispielsweise zum Anstieg des Blutdrucks, zur Plättchenaktivierung oder zu vermehrter Zellproliferation und Zelladhäsion. Als

5 Folge kommt es zur Ausbildung von endothelialer Dysfunktion, Atherosklerose, Bluthochdruck, stabiler oder instabiler Angina pectoris, Thrombosen, Myocardinfarkt, Schlaganfällen oder erktiler Dysfunktion. Die pharmakologische Stimulation der sGC bietet eine Möglichkeit zur Normalisierung der cGMP-Produktion und erlaubt damit die Behandlung bzw. Prävention derartiger Krankheiten.

10

Zur pharmakologischen Stimulation der sGC wurden bisher fast ausschließlich Verbindungen verwendet, deren Wirkung auf einer intermediären NO-Freisetzung beruht, beispielsweise organische Nitrate. Der Nachteil dieser Behandlungsweise liegt in der Toleranzentwicklung und Wirkungsabschwächung und der deshalb 15 erforderlich werdenden höheren Dosierung.

Verschiedene nicht über eine NO-Freisetzung wirkende sGC-Stimulatoren wurden von Vesely in einer größeren Zahl von Arbeiten beschrieben. Die Verbindungen, bei denen es sich zumeist um Hormone, Pflanzenhormone, Vitamine oder zum Beispiel

20 Naturstoffe wie Echsengifte handelt, zeigen jedoch durchweg nur schwache Effekte auf die cGMP-Bildung in Zellsäten (D. L. Vesely, Eur. J. Clin. Invest. 15 (1985) 258; D. L. Vesely, Biochem. Biophys. Res. Comm. 88 (1979) 1244). Eine Stimulation Häm-freier Guanylatcyclase durch Protoporphyrin IX wurde durch Ignarro et al. (Adv. Pharmacol. 26 (1994) 35) nachgewiesen. Pettibone et al. (Eur. J. Pharmacol. 116 25 (1985) 307) beschrieben für Diphenyliodoniumhexafluorophoshat eine blutdrucksenkende Wirkung und führten diese auf eine Stimulation der sGC zurück. Isoliquiritigenin, das an isolierten Rattenaorten eine relaxierende Wirkung zeigt, aktiviert laut Yu et al. (Brit. J. Pharmacol. 114 (1995) 1587) ebenfalls die sGC. Ko et al. (Blood 84 (1994) 4226), Yu et al. (Biochem. J. 306 (1995) 787) und Wu et al. 30 (Brit. J. Pharmacol. 116 (1995) 1973) wiesen eine sGC-stimulierende Aktivität von 1-Benzyl-3-(5-hydroxymethyl-2-furyl)-indazol nach und demonstrierten eine

antiproliferative und thrombozytenhemmende Wirkung. Substituierte Pyrazole und kondensierte Pyrazole, die eine sGC-stimulierende Wirkung haben, werden in der EP-A-908456 und der DE-A-19744027 beschrieben, substituierte Chinazoline mit einer derartigen Wirkung in der DE-A-19756388.


5

Verschiedene 4-Amino-2-aryl-pyrimidine sind bereits bekannt. So werden in der EP-A-55693 Pyrimidine beschrieben, die in der 2-Position durch eine Phenylgruppe substituiert sind und die sich als Gegenmittel zum Schutz von Kulturpflanzen vor der phytotoxischen Wirkung von Herbiziden eignen. In der EP-A-136976 werden 2-

10 Phenylpyrimidine beschrieben, die Regulatoren des Pflanzenwuchses sind. Für bestimmte 2-Phenylpyrimidine, die in der 4-Position unter anderem eine Aminogruppe als Substituenten tragen können, wird in der EP-A-555478 beschrieben, daß sie das Lernvermögen und die Gedächtnisleistung verbessern.

15 Überraschend wurde nun gefunden, daß die erfindungsgemäßen Pyrimidine der Formel I eine starke Guanylatcyclase-Aktivierung bewirken, aufgrund derer sie zur Therapie und Prophylaxe von Krankheiten geeignet sind, die mit einem niedrigen cGMP-Spiegel verbunden sind.

20 Die vorliegende Erfindung betrifft somit Verbindungen der Formel I,



in der

25  $\text{R}^1$  für ( $\text{C}_1\text{-C}_8$ )-Alkyl, das durch einen oder mehrere gleiche oder verschiedene Substituenten aus der Reihe Hydroxy, ( $\text{C}_1\text{-C}_4$ )-Alkoxy, ( $\text{C}_1\text{-C}_4$ )-Alkyl- $\text{S}(\text{O})_m$ -,  $\text{R}^5\text{R}^6\text{N}$  und Aryl substituiert sein kann, ( $\text{C}_3\text{-C}_9$ )-Cycloalkyl, das durch einen oder mehrere

gleiche oder verschiedene Substituenten aus der Reihe (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkyl, Hydroxy und Amino substituiert sein kann, oder den Rest eines 5-gliedrigen bis 7-gliedrigen gesättigten heterocyclischen Ringes, der ein oder zwei gleiche oder verschiedene Hetero-Ringglieder aus der Reihe O, NR<sup>7</sup> und S(O)<sub>m</sub> enthält und der durch einen

5 oder mehrere gleiche oder verschiedene Substituenten aus der Reihe (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkyl und Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-alkyl- substituiert sein kann, steht;

und

R<sup>2</sup> für Wasserstoff, (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl, das durch einen oder mehrere gleiche oder verschiedene Substituenten aus der Reihe Hydroxy, (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkoxy, (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-

10 Alkyl-S(O)<sub>m</sub>-, R<sup>5</sup>R<sup>6</sup>N und Aryl substituiert sein kann, (C<sub>3</sub>-C<sub>9</sub>)-Cycloalkyl, das durch einen oder mehrere gleiche oder verschiedene Substituenten aus der Reihe (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkyl, Hydroxy und Amino substituiert sein kann, oder den Rest eines 5-gliedrigen bis 7-gliedrigen gesättigten heterocyclischen Ringes, der ein oder zwei gleiche oder verschiedene Hetero-Ringglieder aus der Reihe O, NR<sup>7</sup> und S(O)<sub>m</sub> enthält und der

15 durch einen oder mehrere gleiche oder verschiedene Substituenten aus der Reihe (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkyl und Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-alkyl- substituiert sein kann, steht;

oder

R<sup>1</sup>R<sup>2</sup>N für einen über ein Ringstickstoffatom gebundenen Rest eines 5-gliedrigen bis 7-gliedrigen gesättigten heterocyclischen Ringes steht, der neben dem die Reste R<sup>1</sup>

20 und R<sup>2</sup> tragenden Stickstoffatom ein weiteres Hetero-Ringglied aus der Reihe O, NR<sup>7</sup> und S(O)<sub>m</sub> enthalten kann und der durch einen oder mehrere gleiche oder verschiedene Substituenten aus der Reihe (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkyl, Hydroxy, (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkoxy, R<sup>8</sup>R<sup>9</sup>N, Hydroxycarbonyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkoxycarbonyl und R<sup>8</sup>R<sup>9</sup>N-CO- substituiert sein kann;

25 R<sup>3</sup> für Aryl steht;

R<sup>4</sup> für (C<sub>2</sub>-C<sub>5</sub>)-Alkyl, Trifluormethyl oder Aryl steht;

$R^5$  und  $R^6$  für gleiche oder verschiedene Reste aus der Reihe Wasserstoff und ( $C_1$ - $C_4$ )-Alkyl stehen oder die Gruppe  $R^5R^6N$  für einen über ein Ringstickstoffatom gebundenen Rest eines 5-gliedrigen bis 7-gliedrigen gesättigten oder ungesättigten heterocyclischen Ringes steht, der neben dem die Reste  $R^5$  und  $R^6$  tragenden

5 Stickstoffatom als weiteres Hetero-Ringglied noch ein Sauerstoffatom, eine Gruppe  $S(O)_m$  oder ein Stickstoffatom enthalten kann und der an Ringkohlenstoffatomen einen oder mehrere gleiche oder verschiedene Substituenten aus der Reihe ( $C_1$ - $C_4$ )-Alkyl, Hydroxy und Amino tragen kann und an einem Ringstickstoffatom einen Rest  $R^7$  tragen kann;

10  $R^7$  für Wasserstoff, ( $C_1$ - $C_4$ )-Alkyl, Aryl-( $C_1$ - $C_4$ )-alkyl-, Hydroxy-( $C_1$ - $C_4$ )-alkyl-, Hydroxycarbonyl-( $C_1$ - $C_4$ )-alkyl-, (( $C_1$ - $C_4$ )-Alkoxy carbonyl)-(  $C_1$ - $C_4$ )-alkyl-,  $R^8R^9N-CO-(C_1-C_4)$ -alkyl-,  $R^{10}-SO_2$ - oder Aryl steht, wobei  $R^7$  dann, wenn diese Gruppe an einem für  $R^1R^2N$  stehenden Piperazinorest steht, nicht für

15 carbocyclisches Aryl oder carbocyclisches Aryl-( $C_1$ - $C_4$ )-alkyl- stehen kann;

$R^8$  und  $R^9$  für gleiche oder verschiedene Reste aus der Reihe Wasserstoff und ( $C_1$ - $C_4$ )-Alkyl stehen;

20  $R^{10}$  für ( $C_1$ - $C_4$ )-Alkyl, Aryl oder  $R^8R^9N$  steht;

Aryl für Phenyl, Naphthyl oder Heteroaryl steht, die alle durch einen oder mehrere gleiche oder verschiedene Substituenten aus der Reihe Halogen, ( $C_1$ - $C_4$ )-Alkyl, Phenyl,  $CF_3$ ,  $NO_2$ , OH, -O-( $C_1$ - $C_4$ )-Alkyl, -O-( $C_2$ - $C_4$ )-Alkyl-O-( $C_1$ - $C_4$ )-Alkyl, ( $C_1$ - $C_2$ )-

25 Alkylendioxy,  $NH_2$ , -NH-( $C_1$ - $C_4$ )-Alkyl, -N(( $C_1$ - $C_4$ )-Alkyl)<sub>2</sub>, -NH-CHO, -NH-CO-( $C_1$ - $C_4$ )-Alkyl, -CN, -CO-NH<sub>2</sub>, -CO-NH-( $C_1$ - $C_4$ )-Alkyl, -CO-N(( $C_1$ - $C_4$ )-Alkyl)<sub>2</sub>, -CO-OH, -CO-O-( $C_1$ - $C_4$ )-Alkyl, -CHO und -CO-( $C_1$ - $C_4$ )-Alkyl substituiert sein können;

Heteroaryl für den Rest eines monocyclischen 5-gliedrigen oder 6-gliedrigen

30 aromatischen Heterocyclus oder eines bicyclischen 8-gliedrigen bis 10-gliedrigen

aromatischen Heterocyclus steht, die jeweils ein oder mehrere gleiche oder verschiedene Ringheteroatome aus der Reihe N, O und S enthalten;

m für 0, 1 oder 2 steht;

5

in allen ihren stereoisomeren Formen und Mischungen davon in allen Verhältnissen, und ihre physiologisch verträglichen Salze,

wobei Verbindungen der Formel I ausgeschlossen sind, in denen gleichzeitig R<sup>4</sup> für  
10 tert-Butyl oder Trifluormethyl steht, R<sup>3</sup> für Phenyl steht, das durch einen oder zwei  
gleiche oder verschiedene Substituenten aus der Reihe Halogen, OH, -O-R<sup>11</sup> und  
CF<sub>3</sub> substituiert sein kann, R<sup>1</sup>R<sup>2</sup>N für R<sup>11</sup>-NH-, (R<sup>11</sup>)<sub>2</sub>N- oder R<sup>12</sup>R<sup>13</sup>N-(CH<sub>2</sub>)<sub>p</sub>-NH-  
steht, p für 2 oder 3 steht, R<sup>11</sup> für gesättigtes unsubstituiertes (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkyl steht und  
R<sup>12</sup> und R<sup>13</sup> für gleiche oder verschiedene Reste aus der Reihe Wasserstoff und R<sup>11</sup>  
15 stehen oder die Gruppe R<sup>12</sup>R<sup>13</sup>N für einen über ein Ringstickstoffatom gebundenen  
Rest eines 5-gliedrigen oder 6-gliedrigen gesättigten heterocyclischen Ringes steht,  
der neben dem die Reste R<sup>12</sup> und R<sup>13</sup> tragenden Stickstoffatom als weiteres Hetero-  
Ringglied noch ein Sauerstoffatom, ein Schwefelatom oder ein Stickstoffatom  
enthalten kann und der durch einen Arylrest oder durch einen Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-alkylrest  
20 substituiert sein kann, wobei die Arylgruppe durch einen oder zwei gleiche oder  
verschiedene Substituenten aus der Reihe Halogen, OH, -O-R<sup>11</sup> und CF<sub>3</sub> substituiert  
sein kann.

Können Gruppen oder Substituenten mehrfach in den Verbindungen der Formel I  
25 vorkommen, so können sie alle unabhängig voneinander die angegebenen  
Bedeutungen haben und können jeweils gleich oder verschieden sein.

Alkylreste können geradkettig oder verzweigt sein. Dies gilt auch, wenn sie in  
anderen Gruppen enthalten sind, zum Beispiel in Alkoxygruppen,  
30 Alkoxy carbonylgruppen oder in Aminogruppen, oder wenn sie substituiert sind.  
Beispiele für Alkylgruppen sind Methyl, Ethyl, Propyl, Butyl, Pentyl, Hexyl, Heptyl,

Octyl, die n-Isomeren dieser Reste, Isopropyl, Isobutyl, Isopentyl, sec-Butyl, tert-Butyl, Neopentyl, 3,3-Dimethylbutyl. Unter dem Begriff Alkyl sind hier neben gesättigten Alkylresten ausdrücklich auch ungesättigte Alkylreste zu verstehen, also Alkylreste, die eine oder mehrere Doppelbindungen und/oder eine oder mehrere

5 Dreifachbindungen enthalten, zum Beispiel Alkenylreste und Alkinylreste.

Naturgemäß muß ein ungesättigter Alkylrest mindestens zwei Kohlenstoffatome enthalten, eine (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkylgruppe zum Beispiel umfaßt also gesättigte (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkylreste und ungesättigte (C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkylreste, ein (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkylrest umfaßt gesättigte (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkylreste und ungesättigte (C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkylreste. Beispiele für ungesättigte

10 Alkylreste sind der Vinylrest, der 2-Propenylrest (Allylrest), der 2-Butenylrest, der 2-Methyl-2-propenylrest, der Ethinylrest, der 2-Propinylrest (Propargylrest) oder der 3-Butinylrest. Sind Alkylreste durch einen oder mehrere Substituenten substituiert, so sind sie bevorzugt durch einen, zwei oder drei, insbesondere durch einen oder zwei gleiche oder verschiedene Substituenten substituiert. Substituenten können sich an

15 beliebigen Kohlenstoffatomen des Alkylrestes befinden.

Cycloalkyl ist beispielsweise Cyclopropyl, Cyclobutyl, Cyclopentyl, Cyclohexyl, Cycloheptyl, Cyclooctyl oder Cyclononyl, die alle auch wie angegeben substituiert sein können, zum Beispiel durch einen oder mehrere gleiche oder verschiedene (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkylreste, insbesondere durch Methyl, und/oder durch Hydroxy. Sind Cycloalkylreste durch einen oder mehrere Substituenten substituiert, so sind sie bevorzugt durch einen, zwei, drei oder vier, insbesondere durch einen oder zwei, gleiche oder verschiedene Substituenten substituiert. Beispiele für solche substituierten Cycloalkylreste sind 4-Methylcyclohexyl, 4-tert-Butylcyclohexyl, 4-Hydroxycyclohexyl, 4-Aminocyclohexyl oder 2,3-Dimethylcyclopentyl. Substituenten können sich an beliebigen Kohlenstoffatomen des Cycloalkylrestes befinden.

Carbocyclische Arylreste wie Phenylreste und Naphthylreste und Heteroarylreste, können, soweit nicht anders angegeben, unsubstituiert sein oder einen oder mehrere, zum Beispiel ein, zwei, drei oder vier, gleiche oder verschiedene Substituenten tragen, die sich in beliebigen Positionen befinden können. Soweit

nicht anders angegeben, können in diesen Resten als Substituenten zum Beispiel die in der Definition der Gruppe Aryl angegebenen Substituenten auftreten. Sind in Verbindungen der Formel I Nitrogruppen als Substituenten vorhanden, so können insgesamt nur bis zu zwei Nitrogruppen im Molekül vorhanden sein. Trägt ein

- 5 Arylrest wie zum Beispiel ein Phenylrest wiederum einen Phenylrest als Substituenten, so kann in letzterem der Benzolring auch wiederum unsubstituiert sein oder durch einen oder mehrere, zum Beispiel ein, zwei, drei oder vier, gleiche oder verschiedene Reste substituiert sein, zum Beispiel durch Reste aus der Reihe (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkyl, Halogen, Hydroxy, (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkoxy, Trifluormethyl, Cyan,
- 10 Hydroxycarbonyl, ((C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkoxy)carbonyl, Aminocarbonyl, Nitro, Amino, (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkylamino, Di-((C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-alkyl)amino und ((C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkyl)carbonylamino.

In monosubstituierten Phenylresten kann sich der Substituent in der 2-Position, der 3-Position oder der 4-Position befinden, in disubstituierten Phenylresten können sich die Substituenten in 2,3-Position, 2,4-Position, 2,5-Position, 2,6-Position, 3,4-Position oder 3,5-Position befinden. In trisubstituierten Phenylresten können sich die Substituenten in 2,3,4-Position, 2,3,5-Position, 2,3,6-Position, 2,4,5-Position, 2,4,6-Position oder 3,4,5-Position befinden. Naphthyl kann 1-Naphthyl oder 2-Naphthyl sein. In monosubstituierten 1-Naphthylresten kann sich der Substituent in der 2-Position, der 3-Position, der 4-Position, der 5-Position, der 6-Position, der 7-Position oder der 8-Position befinden, in monosubstituierten 2-Naphthylresten in der 1-Position, der 3-Position, der 4-Position, der 5-Position, der 6-Position, der 7-Position oder der 8-Position. Auch in mehrfach substituierten Naphthylresten, zum Beispiel zweifach oder dreifach substituierten Naphthylresten, können sich die Substituenten 25 in allen möglichen Positionen befinden.

Soweit nicht anders angegeben, leiten sich Heteroarylreste, Reste von gesättigten heterocyclischen Ringen und Reste von Ringen, die von zwei an ein Stickstoffatom gebundenen Gruppen zusammen mit diesem Stickstoffatom gebildet werden, bevorzugt von Heterocyclen ab, die ein, zwei, drei oder vier gleiche oder verschiedene Ringheteroatome enthalten, besonders bevorzugt von Heterocyclen,

die ein oder zwei oder drei, insbesondere ein oder zwei, gleiche oder verschiedene Ringheteroatome enthalten. Soweit nicht anders angegeben, können die Heterocyclen monocyclisch oder polycyclisch sein, zum Beispiel monocyclisch, bicyclisch oder tricyclisch. Bevorzugt sind sie monocyclisch oder bicyclisch,

5 insbesondere monocyclisch. Die einzelnen Ringe enthalten bevorzugt 5, 6 oder 7 Ringglieder. Beispiele für monocyclische und bicyclische heterocyclische Systeme, von denen sich in den Verbindungen der Formel I vorkommende Reste ableiten können, sind Pyrrol, Furan, Thiophen, Imidazol, Pyrazol, 1,2,3-Triazol, 1,2,4-Triazol, 1,3-Dioxol, 1,3-Oxazol, 1,2-Oxazol, 1,3-Thiazol, 1,2-Thiazol, Tetrazol, Pyridin,

10 Pyridazin, Pyrimidin, Pyrazin, Pyran, Thiopyran, 1,4-Dioxin, 1,2-Oxazin, 1,3-Oxazin, 1,4-Oxazin, 1,2-Thiazin, 1,3-Thiazin, 1,4-Thiazin, 1,2,3-Triazin, 1,2,4-Triazin, 1,3,5-Triazin, 1,2,4,5-Tetrazin, Azepin, 1,2-Diazepin, 1,3-Diazepin, 1,4-Diazepin, 1,3-Oxazepin, 1,3-Thiazepin, Indol, Benzothiophen, Benzofuran, Benzothiazol, Benzimidazol, Chinolin, Isochinolin, Cinnolin, Chinazolin, Chinoxalin, Phthalazin,

15 Thienothiophene, 1,8-Naphthyridin und andere Naphthyridine, Pteridin, oder Phenothiazin, alle jeweils in gesättigter Form (Perhydro-Form) oder in teilweise ungesättigter Form (zum Beispiel Dihydro-Form und Tetrahydro-Form) oder in maximal ungesättigter Form, soweit die betreffenden Formen bekannt und stabil sind. Zu den in Betracht kommenden Heterocyclen gehören somit beispielsweise

20 auch die gesättigten Heterocyclen Pyrrolidin, Piperidin, Perhydroazepin (Hexamethylenimin), Piperazin, Morpholin, 1,3-Thiazolidin und Thiomorpholin. Der Sättigungsgrad von heterocyclischen Gruppen ist bei den einzelnen Definitionen angegeben. Ungesättigte Heterocyclen können zum Beispiel eine, zwei oder drei. Doppelbindungen im Ringsystem enthalten. 5-Ringe und 6-Ringe in monocyclischen und polycyclischen Heterocyclen können insbesondere auch aromatisch sein.

25

Heterocyclische Reste können über jedes geeignete Ringkohlenstoffatom gebunden sein. Stickstoffheterocyclen, zum Beispiel Pyrrol, Imidazol, Pyrrolidin, Piperidin, Hexamethylenimin, 1,3-Thiazolidin, Morpholin, Thiomorpholin, Piperazin etc.,

30 können auch über jedes geeignete Ringstickstoffatom gebunden sein, insbesondere, wenn der betreffende Stickstoffheterocyclus an ein Kohlenstoffatom gebunden ist.

Beispielsweise kann ein Thienylrest als 2-Thienylrest oder 3-Thienylrest vorliegen, ein Furanrest als 2-Furylrest oder 3-Furylrest, ein Pyridylrest als 2-Pyridylrest, 3-

Pyridylrest oder 4-Pyridylrest, ein Piperidinrest als 1-Piperidinylrest (=

Piperidinorest), 2-Piperidinylrest, 3-Piperidinylrest oder 4-Piperidinylrest, ein

5 (Thio)Morpholinrest als 2-(Thio)Morpholinylrest, 3-(Thio)Morpholinylrest oder 4-(Thio)Morpholinylrest (= (Thio)Morpholinorest). Ein Rest, der sich vom 1,3-Thiazol ableitet, kann über die 2-Position, die 3-Position, die 4-Position oder die 5-Position gebunden sein, ein Rest, der sich vom Imidazol ableitet, über die 1-Position, die 2-Position, die 4-Position oder die 5-Position.

10

Soweit nicht anders angegeben, können die heterocyclischen Gruppen unsubstituiert sein oder einen oder mehrere, zum Beispiel einen, zwei, drei oder vier, gleiche oder verschiedene Substituenten tragen. Die Substituenten in Heterocyclen können sich in beliebigen Positionen befinden, beispielsweise in einem 2-Thienylrest oder 2-Furylrest in der 3-Position und/oder in der 4-Position und/oder in der 5-Position, in einem 3-Thienylrest oder 3-Furylrest in der 2-Position und/oder in der 4-Position und/oder in der 5-Position, in einem 2-Pyridylrest in der 3-Position und/oder in der 4-Position und/oder in der 5-Position und/oder in der 6-Position, in einem 3-Pyridylrest in der 2-Position und/oder in der 4-Position und/oder 15 in der 5-Position und/oder in der 6-Position, in einem 4-Pyridylrest in der 2-Position und/oder in der 3-Position und/oder in der 5-Position und/oder in der 6-Position.

20 Soweit nicht anders angegeben, können als Substituenten zum Beispiel die in der Definition der Gruppe Aryl angegebenen Substituenten auftreten, im Falle von gesättigten oder teilweise ungesättigten Heterocyclen als weiterere Substituenten

25 auch die Oxogruppe und die Thioxogruppe. Substituenten an einem Heterocyclus wie auch Substituenten an einem Carbocyclus können auch einen Ring bilden, es können also an ein Ringsystem weitere Ringe ankondensiert sein, so daß zum Beispiel cyclopenta-kondensierte, cyclohexa-kondensierte oder benzo-kondensierte Ringe vorliegen können. Soweit nicht anders angegeben, kommen als Substituenten 30 an einem substituierbaren Stickstoffatom eines Heterocyclus zum Beispiel unsubstituierte und substituierte (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkylreste, Arylreste, Acylreste wie

-CO-(C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkyl oder -CO-Aryl, oder Sulfonylreste wie -SO<sub>2</sub>-(C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkyl oder -SO<sub>2</sub>-Aryl in Betracht. Geeignete Schwefelheterocyclen können auch als S-Oxide oder S,S-Dioxide vorliegen, das heißt, sie können an Stelle eines Schwefelatoms die Gruppe S(=O) oder die Gruppe S(=O)<sub>2</sub> enthalten. Geeignete Stickstoffheterocyclen 5 können auch als N-Oxide oder als Quartärsalze mit einem von einer physiologisch verträglichen Säure abgeleiteten Anion als Gegenion vorliegen. Pyridylreste können zum Beispiel als Pyridin-N-oxide vorliegen.

Halogen bedeutet Fluor, Chlor, Brom oder Iod, vorzugsweise Fluor oder Chlor.

10

Die vorliegende Erfindung umfaßt alle stereoisomeren Formen der Verbindungen der Formel I. In den Verbindungen der Formel I enthaltene Asymmetriezentren können alle unabhängig voneinander die S-Konfiguration oder die R-Konfiguration aufweisen. Zur Erfindung gehören alle möglichen Enantiomeren und 15 Diastereomeren, ebenso Mischungen von zwei oder mehr stereoisomeren Formen, zum Beispiel Mischungen von Enantiomeren und/oder Diastereomeren, in allen Verhältnissen. Enantiomere sind also in enantiomerenreiner Form, sowohl als linksdrehende als auch als rechtsdrehende Antipoden, in Form von Racematen und in Form von Mischungen der beiden Enantiomeren in allen Verhältnissen 20 Gegenstand der Erfindung. Bei Vorliegen einer cis/trans-Isomerie, zum Beispiel an Doppelbindungen oder Cycloalkylgruppen, sind sowohl die cis-Form als auch die trans-Form und Gemische dieser Formen in allen Verhältnissen Gegenstand der Erfindung. Die Herstellung von einzelnen Stereoisomeren kann gewünschtenfalls durch Auftrennung eines Gemisches nach üblichen Methoden, zum Beispiel durch 25 Chromatographie oder Kristallisation, durch Verwendung von stereochemisch einheitlichen Ausgangssubstanzen bei der Synthese oder durch stereoselektive Synthese erfolgen. Gegebenenfalls kann vor einer Trennung von Stereoisomeren eine Derivatisierung erfolgen. Die Trennung eines Stereoisomerengemisches kann auf der Stufe der Verbindungen der Formel I erfolgen oder auf der Stufe eines 30 Zwischenprodukts im Verlaufe der Synthese. Bei Vorliegen von beweglichen

Wasserstoffatomen umfaßt die vorliegende Erfindung auch alle tautomeren Formen der Verbindungen der Formel I.

Enthalten die Verbindungen der Formel I eine oder mehrere saure oder basische

5 Gruppen, so sind auch die entsprechenden physiologisch oder toxikologisch verträglichen Salze Gegenstand der Erfindung, insbesondere die pharmazeutisch verwendbaren Salze. So können die Verbindungen der Formel I, die saure Gruppen enthalten, an diesen Gruppen beispielsweise als Alkalimetallsalze, Erdalkalimetallsalze oder als Ammoniumsalze vorliegen und erfindungsgemäß

10 verwendet werden. Beispiele für solche Salze sind Natriumsalze, Kaliumsalze, Calciumsalze, Magnesiumsalze oder Salze mit Ammoniak oder organischen Aminen wie beispielsweise Ethylamin, Ethanolamin, Triethanolamin oder Aminosäuren.

15 Verbindungen der Formel I, die eine oder mehrere basische, das heißt protonierbare, Gruppen enthalten, können in Form ihrer Säureadditionssalze mit physiologisch verträglichen anorganischen oder organischen Säuren vorliegen und erfindungsgemäß verwendet werden, zum Beispiel als Salze mit Chlorwasserstoff, Bromwasserstoff, Phosphorsäure, Schwefelsäure, Salpetersäure, Methansulfonsäure, p-Toluolsulfonsäure, Naphthalindisulfonsäuren, Oxalsäure, Essigsäure, Weinsäure, Milchsäure, Salicylsäure, Benzoësäure, Ameisensäure,

20 Propionsäure, Pivalinsäure, Diethylessigsäure, Malonsäure, Bernsteinsäure, Pimelinsäure, Fumarsäure, Maleinsäure, Äpfelsäure, Sulfaminsäure, Phenylpropionsäure, Gluconsäure, Ascorbinsäure, Isonicotinsäure, Zitronensäure, Adipinsäure usw. Enthalten die Verbindungen der Formel I gleichzeitig saure und basische Gruppen im Molekül, so gehören neben den geschilderten Salzformen

25 auch innere Salze oder Betaine (Zwitterionen) zu der Erfindung. Salze können aus den Verbindungen der Formel I nach üblichen, dem Fachmann bekannten Verfahren erhalten werden, beispielsweise durch Vereinigung mit einer organischen oder anorganischen Säure oder Base in einem Lösungsmittel oder Dispergiermittel, oder auch durch Anionenaustausch oder Kationenaustausch aus anderen Salzen. Die

30 vorliegende Erfindung umfaßt auch alle Salze der Verbindungen der Formel I, die sich wegen geringer physiologischer Verträglichkeit nicht direkt für eine Verwendung

in Arzneimitteln eignen, aber zum Beispiel als Zwischenprodukte für chemische Reaktionen oder für die Herstellung physiologisch verträglicher Salze in Betracht kommen.

- 5 Die vorliegende Erfindung umfaßt weiterhin alle Solvate von Verbindungen der Formel I, zum Beispiel Hydrate oder Addukte mit Alkoholen, sowie Derivate der Verbindungen der Formel I wie zum Beispiel Ester und Amide, und Pro-Drugs und aktive Metabolite.
- 10 Bevorzugt steht R<sup>1</sup> für (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl, das durch einen oder mehrere gleiche oder verschiedene Substituenten aus der Reihe Hydroxy, (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkoxy, (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkyl-S(O)<sub>m</sub>-, R<sup>5</sup>R<sup>6</sup>N und Aryl substituiert sein kann, oder für (C<sub>3</sub>-C<sub>9</sub>)-Cycloalkyl, das durch einen oder mehrere gleiche oder verschiedene Substituenten aus der Reihe (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkyl, Hydroxy und Amino substituiert sein kann. Bevorzugt steht R<sup>2</sup> für
- 15 Wasserstoff, (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl, das durch einen oder mehrere gleiche oder verschiedene Substituenten aus der Reihe Hydroxy, (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkoxy, (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkyl-S(O)<sub>m</sub>-, R<sup>5</sup>R<sup>6</sup>N und Aryl substituiert sein kann, oder für (C<sub>3</sub>-C<sub>9</sub>)-Cycloalkyl, das durch einen oder mehrere gleiche oder verschiedene Substituenten aus der Reihe (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkyl, Hydroxy und Amino substituiert sein kann. Besonders bevorzugt ist es, wenn R<sup>1</sup> für
- 20 (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl oder (C<sub>3</sub>-C<sub>9</sub>)-Cycloalkyl steht und R<sup>2</sup> für Wasserstoff steht oder wenn R<sup>1</sup> und R<sup>2</sup> für gleiches oder verschiedenes (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl stehen, wobei alle Reste unsubstituiert oder wie angegeben substituiert sein können. Ganz besonders bevorzugt ist, wenn R<sup>1</sup> für (C<sub>3</sub>-C<sub>9</sub>)-Cycloalkyl, das durch einen oder mehrere gleiche oder verschiedene Substituenten aus der Reihe (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkyl, Hydroxy und Amino
- 25 substituiert sein kann, steht, und R<sup>2</sup> für Wasserstoff steht. Wenn R<sup>1</sup> für (C<sub>3</sub>-C<sub>9</sub>)-Cycloalkyl, das durch einen oder mehrere gleiche oder verschiedene Substituenten aus der Reihe (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkyl, Hydroxy und Amino substituiert sein kann, oder für den Rest eines 5-gliedrigen, 6-gliedrigen oder 7-gliedrigen gesättigten heterocyclischen Ringes, der ein oder zwei gleiche oder verschiedene Hetero-Ringglieder aus der
- 30 Reihe O, NR<sup>7</sup> und S(O)<sub>m</sub> enthält und der durch einen oder mehrere gleiche oder

verschiedene Substituenten aus der Reihe (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkyl und Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-alkyl-substituiert sein kann, steht, dann steht R<sup>2</sup> bevorzugt für Wasserstoff. Ein für R<sup>1</sup> oder R<sup>2</sup> stehender Alkylrest ist bevorzugt ein unsubstituierter oder substituierter (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkylrest. Ein für R<sup>1</sup> oder R<sup>2</sup> stehender (C<sub>3</sub>-C<sub>9</sub>)-Cycloalkylrest ist bevorzugt ein 5 unsubstituierter oder substituierter (C<sub>3</sub>-C<sub>7</sub>)-Cycloalkylrest.

Neben den vorstehend genannten bevorzugten Bedeutungen von R<sup>1</sup> und R<sup>2</sup> ist es weiterhin bevorzugt, wenn die Gruppe R<sup>1</sup>R<sup>2</sup>N für einen über ein Ringstickstoffatom gebundenen Rest eines 5-gliedrigen, 6-gliedrigen oder 7-gliedrigen gesättigten 10 heterocyclischen Ringes steht, der neben dem die Reste R<sup>1</sup> und R<sup>2</sup> tragenden Stickstoffatom als weiteres Hetero-Ringglied noch ein Sauerstoffatom, eine Gruppe S(O)<sub>m</sub> oder ein einen Rest R<sup>7</sup> tragendes Stickstoffatom enthalten kann und der durch einen oder mehrere gleiche oder verschiedene Substituenten aus der Reihe (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkyl, Hydroxy, (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkoxy, R<sup>8</sup>R<sup>9</sup>N, Hydroxycarbonyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkoxycarbonyl und 15 R<sup>8</sup>R<sup>9</sup>N-CO- substituiert sein kann. Ein für R<sup>1</sup>R<sup>2</sup>N stehender Rest eines heterocyclischen Ringes leitet sich bevorzugt von einem 5-gliedrigen oder 6-gliedrigen gesättigten heterocyclischen Ring ab, besonders bevorzugt vom Piperidin, Morphin, Thiomorpholin (und seinem S-Oxid und S,S-Dioxid) oder Piperazin, die alle wie angegeben substituiert sein können, ganz besonders bevorzugt vom 20 unsubstituierten Piperidin, Morphin oder Thiomorpholin (und seinem S-Oxid und S,S-Dioxid) oder vom N-Methylpiperazin.

Die für R<sup>3</sup> stehende Arylgruppe steht bevorzugt für unsubstituiertes oder substituiertes Phenyl, besonders bevorzugt für substituiertes Phenyl, ganz 25 besonders bevorzugt für Phenyl, das durch einen oder zwei der oben für Aryl angegebenen Substituenten substituiert ist. Speziell bevorzugt steht R<sup>3</sup> für Phenyl, das durch ein oder zwei gleiche oder verschiedene Substituenten aus der Reihe Halogen und (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkyl substituiert ist, darüber hinaus bevorzugt für Phenyl, das durch Chlor oder Methyl substituiert ist. Der Substituent in einer für R<sup>3</sup> stehenden 30 einfach substituierten Phenylgruppe steht bevorzugt in der para-Position.

$R^4$  steht bevorzugt für ( $C_2$ - $C_5$ )-Alkyl, Trifluormethyl oder unsubstituiertes oder substituiertes Phenyl, besonders bevorzugt für geradkettiges oder verzweigtes ( $C_3$ - $C_4$ )-Alkyl, zum Beispiel n-Propyl, Isopropyl, n-Butyl, Isobutyl oder tert-Butyl.

- 5    Aryl steht bevorzugt für Phenyl oder 5-gliedriges oder 6-gliedriges monocyclisches Heteroaryl mit einem oder zwei, insbesondere einem Heteroatom aus der Reihe N, O und S, die wie angegeben substituiert sein können, besonders bevorzugt für unsubstituiertes oder substituiertes Phenyl oder unsubstituiertes Pyridyl, Thienyl oder Furyl, ganz besonders bevorzugt für unsubstituiertes oder substituiertes Phenyl
- 10   oder unsubstituiertes Pyridyl.

Bevorzugte Verbindungen der Formel I sind solche, in denen einer oder mehrere der darin enthaltenen Reste bevorzugte Bedeutungen haben, wobei alle Kombinationen von bevorzugten Substituentendefinitionen Gegenstand der vorliegenden Erfindung


- 15   sind. Auch von allen bevorzugten Verbindungen der Formel I umfaßt die vorliegende Erfindung alle ihre stereoisomeren Formen und Mischungen davon in allen Verhältnissen, und ihre physiologisch verträglichen Salze.

Gegenstand der vorliegenden Erfindung sind auch Verfahren zur Herstellung der

- 20   Verbindungen der Formel I, die im folgenden erläutert sind und nach denen die erfindungsgemäßen Verbindungen erhältlich sind. Die Herstellung der Verbindungen der Formel I kann erfolgen, indem zunächst in an sich bekannter Weise ein Amidin der Formel II mit einem in der 3-Position einen Rest  $R^4$  tragenden 3-Oxopropionsäureester der Formel III zu einem 4-Hydroxypyrimidin der Formel IV
- 25   umgesetzt wird. R in der Formel III steht zum Beispiel für ( $C_1$ - $C_4$ )-Alkyl wie Methyl oder Ethyl. Das Hydroxypyrimidin der Formel IV wird anschließend aktiviert, zum Beispiel durch Überführung in ein 4-Halogenpyrimidin. Beispielsweise lässt sich die Verbindung der Formel IV durch Umsetzung mit einem Phosphorhalogenid wie Phosphoroxychlorid in das 4-Chlorpyrimidin der Formel V überführen. Durch
- 30   Umsetzung der Verbindung der Formel V (oder eines anderen reaktiven Derivats des Hydroxypyrimidins) mit dem gewünschten Amin der Formel VI wird dann unter

Austausch des Chlors gegen die Aminogruppe die erfindungsgemäße Verbindung der Formel I erhalten. Geeignete Lösungsmittel für diese Austauschreaktion sind zum Beispiel Wasser, Alkohole wie Methanol, Ethanol oder Isopropanol, Ether wie Tetrahydrofuran oder Dioxan, Amide wie Dimethylformamid (DMF) oder N-

5 Methylpyrrolidon (NMP), oder Kohlenwasserstoffe oder halogenierte Kohlenwasserstoffe wie Benzol, Toluol, Xylool, Chlorbenzol oder Dichlorbenzol.



10 Die Umsetzungen zur Synthese der Verbindungen der Formel I können in einem weiten Temperaturbereich durchgeführt werden. Bevorzugt sind Reaktionstemperaturen von 20°C bis 150°C. Die Umsetzungen können durch Zusatz von geeigneten Basen wie zum Beispiel Natriumbicarbonat, Natriumcarbonat, Kaliumcarbonat, Natriumalkoholaten, Triethylamin oder Pyridin beschleunigt werden,

15 im ersten und im letzten Schritt zusätzlich auch durch einen Überschuß an Amidin der Formel II bzw. Amin der Formel VI. An Stelle der freien Amidine der Formel II können auch die entsprechenden Amidiniumsalze eingesetzt werden. In diesem Falle ist es besonders günstig, den ersten Schritt unter Zusatz von Basen durchzuführen. Die Zwischenstufen der Formel IV und V und die Endverbindungen

der Formel I können aus dem jeweiligen Reaktionsgemisch nach gängigen Verfahren wie Kristallisation, Sublimation, Chromatographie oder Destillation abgetrennt und gewünschtenfalls gereinigt werden, je nach den Umständen des Einzelfalles können die Zwischenstufen aber auch ohne Zwischenisolierung weiter 5 umgesetzt werden. In den erhaltenen Verbindungen können zudem funktionelle Gruppen umgewandelt werden. Beispielsweise können Thioethergruppierungen durch Oxidation mit einer Peroxyverbindung wie 3-Chlorperbenzoësäure oder Monoperoxyphthalsäure oder Wasserstoffperoxid in Sulfone oder Sulfoxide umgewandelt werden, oder es können Carbonsäureestergruppen zu den 10 Carbonsäuren verseift werden.

Alle Reaktionen zur Synthese der Verbindungen der Formel I sind dem Fachmann an sich wohlbekannt und können unter Standardbedingungen nach oder analog zu Literaturvorschriften durchgeführt werden, wie sie zum Beispiel in Houben-Weyl, 15 Methoden der Organischen Chemie, Thieme-Verlag, Stuttgart, oder Organic Reactions, John Wiley & Sons, New York, beschrieben sind. Je nach den Gegebenheiten des Einzelfalls kann es bei der Synthese der Verbindungen der Formel I zur Vermeidung von Nebenreaktionen auch vorteilhaft oder notwendig sein, bestimmte funktionelle Gruppen vorübergehend durch die Einführung von 20 Schutzgruppen zu blockieren und später dann wieder freizusetzen oder funktionelle Gruppen zunächst in Form von Vorstufen einzusetzen, aus denen in einem späteren Schritt dann die gewünschte funktionelle Gruppe erzeugt wird. Solche Synthesestrategien und die für den Einzelfall geeigneten Schutzgruppen oder Vorstufen sind dem Fachmann bekannt. Die Ausgangsamidine der Formel II oder 25 deren Salze, die Oxoester der Formel III und die Amine der Formel VI sind kommerziell erhältlich oder können nach oder analog zu bekannten Verfahren hergestellt werden.

Die erfindungsgemäßen Verbindungen der Formel I bewirken über die Aktivierung 30 der löslichen Guanylatcyclase (sGC) eine Erhöhung der cGMP-Konzentration und sind deshalb wertvolle Agenzien zur Therapie und Prophylaxe von Krankheiten, die

mit einem niedrigen oder erniedrigten cGMP-Spiegel verbunden sind oder durch einen solchen verursacht werden oder zu deren Therapie oder Prophylaxe eine Erhöhung des vorhandenen cGMP-Spiegels angestrebt wird. Die Aktivierung der sGC durch die Verbindungen der Formel I kann zum Beispiel in dem unten 5 beschriebenen Aktivitätsassay untersucht werden.

Krankheiten und pathologische Zustände, die mit einem niedrigen cGMP-Spiegel verbunden sind oder bei denen eine Erhöhung des cGMP-Spiegels angestrebt wird und zu deren Therapie und Prophylaxe Verbindungen der Formel I eingesetzt 10 werden können, sind zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie endotheliale Dysfunktion, diastolische Dysfunktion, Atherosklerose, Bluthochdruck, stabile und instabile Angina pectoris, Thrombosen, Restenosen, Myocardinfarkt, Schlaganfälle, Herzinsuffizienz oder Pulmonalhypertonie, oder zum Beispiel erektilie Dysfunktion, Asthma bronchiale, chronische Niereninsuffizienz und Diabetes. Verbindungen der 15 Formel I können darüber hinaus eingesetzt werden bei Leberzirrhose sowie zur Verbesserung einer eingeschränkten Lernfähigkeit oder Gedächtnisleistung.

Die Verbindungen der Formel I und ihre physiologisch verträglichen Salze können somit am Tier, bevorzugt am Säugetier, und insbesondere am Menschen als 20 Arzneimittel für sich allein, in Mischungen untereinander oder in Form von pharmazeutischen Zubereitungen verwendet werden. Gegenstand der vorliegenden Erfindung sind daher auch die Verbindungen der Formel I und ihre physiologisch verträglichen Salze zur Verwendung als Arzneimittel, ihre Verwendung zur Normalisierung eines gestörten cGMP-Haushalts und insbesondere ihre 25 Verwendung in der Therapie und Prophylaxe der oben genannten Krankheitsbilder, sowie ihre Verwendung zur Herstellung von Medikamenten dafür. Weiterhin sind Gegenstand der vorliegenden Erfindung pharmazeutische Präparate (oder 30 pharmazeutische Zusammensetzungen), die eine wirksame Dosis mindestens einer Verbindung der Formel I und/oder eines physiologisch verträglichen Salzes davon als aktiven Bestandteil und einen pharmazeutisch verträglichen Träger, das heißt

einen oder mehrere übliche pharmazeutisch verträgliche Trägerstoffe und/oder Hilfsstoffe (oder Zusatzstoffe), enthalten.

Die erfindungsgemäßen Arzneimittel können oral, zum Beispiel in Form von Pillen,

5 Tabletten, Filmtabletten, Dragees, Granulaten, Hart- und Weichgelatinekapseln, wäßrigen, alkoholischen oder öligen Lösungen, Sirupen, Emulsionen oder Suspensionen, oder rektal, zum Beispiel in Form von Suppositorien, verabreicht werden. Die Verabreichung kann aber auch parenteral erfolgen, zum Beispiel subkutan, intramuskulär oder intravenös in Form von Injektionslösungen oder

10 Infusionslösungen. Weitere in Betracht kommende Applikationsformen sind zum Beispiel die perkutane oder topische Applikation, zum Beispiel in Form von Salben, Tinkturen, Sprays oder transdermalen therapeutischen Systemen, oder die inhalative Applikation in Form von Nasalsprays oder Aerosolmischungen, oder zum Beispiel Mikrokapseln, Implantate oder Rods. Die bevorzugte Applikationsform hängt

15 zum Beispiel von der zu behandelnden Krankheit und ihrer Stärke ab.

Die pharmazeutischen Präparate enthalten normalerweise 0.2 bis 500 mg, vorzugsweise 1 bis 200 mg, Wirkstoff der Formel I und/oder dessen physiologisch verträgliche Salze, je nach der Art des Präparats und der vorgesehenen

20 Verwendung kann die Menge des enthaltenen Wirkstoffs aber auch größer sein. Die Herstellung der pharmazeutischen Präparate kann in an sich bekannter Weise erfolgen. Dazu werden ein oder mehrere Verbindungen der Formel I und/oder ihre physiologisch verträglichen Salze zusammen mit einem oder mehreren festen oder flüssigen galenischen Trägerstoffen und/oder Hilfsstoffen und, wenn gewünscht, in

25 Kombination mit anderen Arzneimittelwirkstoffen mit therapeutischer oder prophylaktischer Wirkung in eine geeignete Verabreichungsform bzw. Dosierungsform gebracht, die dann als Arzneimittel in der Humanmedizin oder Veterinärmedizin verwendet werden kann. Die pharmazeutischen Präparate enthalten normalerweise 0.5 bis 90 Gewichtsprozent der Verbindungen der Formel I

30 und/oder ihrer physiologisch verträglichen Salze.

Für die Herstellung beispielsweise von Pillen, Tabletten, Dragees und Hartgelatinekapseln kann man Lactose, Stärke, zum Beispiel Maisstärke, oder Stärkederivate, Talk, Stearinsäure oder deren Salze, etc. verwenden. Trägerstoffe für Weichgelatinekapseln und Suppositorien sind zum Beispiel Fette, Wachse,

- 5 halbfeste und flüssige Polyole, natürliche oder gehärtete Öle etc. Als Trägerstoffe für die Herstellung von Lösungen, zum Beispiel Injektionslösungen, oder von Emulsionen oder Sirupen eignen sich beispielsweise Wasser, physiologische Kochsalzlösung, Alkohole wie Ethanol, Glycerin, Polyole, Saccharose, Invertzucker, Glucose, Mannit, pflanzliche Öle etc. Die Verbindungen der Formel I und ihre 10 physiologisch verträglichen Salze können auch lyophilisiert werden und die erhaltenen Lyophilisate zum Beispiel zur Herstellung von Injektionspräparaten oder Infusionspräparaten verwendet werden. Als Trägerstoffe für Mikrokapseln, Implantate oder Rods eignen sich zum Beispiel Mischpolymerisate aus Glykolsäure und Milchsäure.

15

Die pharmazeutischen Präparate können neben den Wirkstoffen und Trägerstoffen noch übliche Hilfsstoffe oder Zusatzstoffe enthalten, zum Beispiel Füllstoffe, Spreng-, Binde-, Gleit-, Netz-, Stabilisierungs-, Emulgier-, Dispergier-, Konservierungs-, Süß-, Färbe-, Geschmacks-, Aromatisierungs-, Dickungs-,

- 20 Verdünnungsmittel, Puffersubstanzen, Lösungsmittel, Lösungsvermittler, Mittel zur Erzielung eines Depoteffekts, Salze zur Veränderung des osmotischen Drucks, Überzugsmittel oder Antioxidantien.

Die Dosierung des zu verabreichenden Wirkstoffs der Formel I und/oder eines 25 physiologisch verträglichen Salze davon hängt vom Einzelfall ab und ist wie üblich für eine optimale Wirkung den individuellen Gegebenheiten anzupassen. So hängt sie ab von der Art und Stärke der zu behandelnden Krankheit sowie von Geschlecht, Alter, Gewicht und individueller Ansprechbarkeit des zu behandelnden Menschen oder Tieres, von der Wirkstärke und Wirkdauer der eingesetzten Verbindungen, 30 davon, ob akut oder chronisch therapiert wird oder Prophylaxe betrieben wird, oder davon, ob neben Verbindungen der Formel I weitere Wirkstoffe verabreicht werden.

Im allgemeinen ist eine Tagesdosis von etwa 0.01 bis 100 mg/kg, vorzugsweise 0.1 bis 10 mg/kg, insbesondere 0.3 bis 5 mg/kg (jeweils mg pro kg Körpergewicht) bei Verabreichung an einen ca. 75 kg schweren Erwachsenen zur Erzielung der angestrebten Wirkung angemessen. Die Tagesdosis kann in einer Einzeldosis 5 verabreicht werden oder, insbesondere bei der Applikation größerer Mengen, in mehrere, zum Beispiel zwei, drei oder vier Einzeldosen aufgeteilt werden. Gegebenenfalls kann es, je nach individuellem Verhalten, erforderlich werden, von der angegebenen Tagesdosis nach oben oder nach unten abzuweichen.

10 Die Verbindungen der Formel I aktivieren die lösliche Guanylatcyclase. Aufgrund dieser Eigenschaft können sie außer als Arzneimittelwirkstoffe in der Humanmedizin und Veterinärmedizin auch als wissenschaftliches Tool oder als Hilfsmittel für biochemische Untersuchungen eingesetzt werden, bei denen eine derartige Beeinflussung der Guanylatcyclase beabsichtigt ist, sowie für diagnostische Zwecke, 15 zum Beispiel in der in vitro-Diagnostik von Zellproben oder Gewebsproben. Ferner können die Verbindungen der Formel I und ihre Salze, wie bereits oben erwähnt, als Zwischenprodukte zur Herstellung weiterer Arzneimittelwirkstoffe dienen.

Die nachfolgenden Beispiele erläutern die Erfindung, ohne sie einzuschränken.

20

### Beispiele

#### Beispiel 1

25 2-(4-Chlorphenyl)-4-hydroxy-6-isopropyl-pyrimidin  
Eine Mischung aus 19.1 g 4-Chlorbenzamidin-hydrochlorid, 15.8 g 4-Methyl-3-oxopentansäureethylester, 11.2 g Kalium-tert-butylat und 200 ml Ethanol wurde 2 Stunden unter Rückfluß erhitzt. Nach dem Abkühlen auf Raumtemperatur wurde der Feststoff abgesaugt, mit Wasser und mit wenig Ethanol gewaschen und im Vakuum 30 bei 40°C getrocknet. Ausbeute: 12.5 g.  
Schmp.: 164°C

Analog wurden hergestellt:

Beispiel 2

5 2-(4-Chlorphenyl)-4-hydroxy-6-trifluormethyl-pyrimidin; Schmp.: 258°C

Beispiel 3

2-(4-Chlorphenyl)-6-tert-butyl-4-hydroxy-pyrimidin; Schmp.: 193°C

10 Beispiel 4

2-(4-Chlorphenyl)-4-hydroxy-6-phenyl-pyrimidin; Schmp.: 306°C

Beispiel 5

2-(4-Methylphenyl)-4-hydroxy-6-isopropyl-pyrimidin; Schmp.: 164°C

15

Beispiel 6

2-(3,5-Dichlorphenyl)-4-hydroxy-6-isopropyl-pyrimidin; Schmp.: 203°C

Beispiel 7

20 2-(4-Aminocarbonyl-phenyl)-4-hydroxy-6-isopropyl-pyrimidin; Schmp.: 294°C

Beispiel 8

4-Chlor-2-(4-chlorphenyl)-6-isopropyl-pyrimidin

Die Mischung aus 12 g 2-(4-Chlorphenyl)-4-hydroxy-6-isopropyl-pyrimidin und 35 ml  
25 Phosphoroxychlorid wurde 3 Stunden unter Rühren auf 90°C erhitzt. Der größte Teil  
des Phosphoroxychloridüberschusses wurde im Vakuum abdestilliert, der Rückstand  
wurde auf 100 ml Eiswasser gegeben und verrührt. Der sich bildende feste weiße  
Niederschlag wurde abgesaugt und im Vakuum bei Raumtemperatur getrocknet.

Ausbeute: 11.4 g.

30 Schmp.: 74°C

Analog wurden hergestellt:

Beispiel 9

4-Chlor-2-(4-chlorphenyl)-6-trifluormethyl-pyrimidin; Schmp.: 76°C

5

Beispiel 10

4-Chlor-2-(4-chlorphenyl)-6-tert-butyl-pyrimidin; Schmp.: 93°C

Beispiel 11

10 4-Chlor-2-(4-chlorphenyl)-6-phenyl-pyrimidin; Schmp.: 127°C

Beispiel 12

4-Chlor-2-(4-methylphenyl)-6-isopropyl-pyrimidin; Schmp.: Öl

15 Beispiel 13

4-Chlor-2-(3,5-dichlorphenyl)-6-isopropyl-pyrimidin; Schmp.: 59°C

Beispiel 14

4-Chlor-2-(4-cyanphenyl)-6-isopropyl-pyrimidin vom Schmp. 114°C wurde in

20 analoger Reaktion ausgehend von 2-(4-Aminocarbonylphenyl)-4-hydroxy-6-isopropyl-pyrimidin erhalten.

Beispiel 15

2-(4-Chlorphenyl)-6-isopropyl-4-((2,2,6,6-tetramethyl-piperidin-4-yl)-amino)-

25 pyrimidin-dihydrochlorid

Eine Mischung aus 534 mg 4-Chlor-2-(4-chlorphenyl)-6-isopropyl-pyrimidin und

1.8 g 4-Amino-2,2,6,6-tetramethyl-piperidin wurde 2 Stunden unter Rühren auf

150°C erhitzt. Nach dem Erkalten wurden 20 ml Wasser zugefügt und die Mischung bei Raumtemperatur gerührt. Der weiße Niederschlag wurde abgesaugt, im Vakuum

30 getrocknet und in 20 ml Ethylacetat aufgenommen. Durch Zusatz von

Chlorwasserstoff wurde die Titelverbindung gefällt, abgesaugt und im Vakuum getrocknet. Ausbeute: 0.8 g.

Schmp.: 359°C

5 Beispiel 16

2-(4-Chlorphenyl)-6-isopropyl-4-morpholino-pyrimidin

Eine Mischung aus 267 mg 4-Chlor-2-(4-chlorphenyl)-6-isopropyl-pyrimidin und 522 mg Morphin wurde 2 Stunden auf 130°C erhitzt. Nach dem Erkalten wurden 20 ml Wasser zugefügt, die Mischung gerührt, der Feststoff abgesaugt und im Vakuum bei

10 50°C getrocknet. Ausbeute: 0.28 g.

Schmp.: 123°C

Analog den Beispielen 15 und 16 wurden die folgenden Verbindungen der Formel I hergestellt. Wenn in der Spalte "Schmp." eine Säure angegeben ist, wurde die

15 Verbindung in Form des Säureadditionssalzes mit der angegebenen Säure erhalten. Die Angabe "2HCl" bedeutet, daß die Verbindung als Dihydrochlorid erhalten wurde.

Bsp.	R <sup>4</sup>	R <sup>3</sup>	R <sup>1</sup> R <sup>2</sup> N	Schmp. (°C)
Nr.				
17	CF <sub>3</sub>	4-Chlor-phenyl	(3-Phenyl-propyl)-amino	Öl
18	CF <sub>3</sub>	4-Chlor-phenyl	(2-Ethylthio-ethyl)-amino	114 (HCl)
19	CF <sub>3</sub>	4-Chlor-phenyl	(1-Benzyl-piperidin-4-yl)-amino	128 (2HCl)
20	CF <sub>3</sub>	4-Chlor-phenyl	4-(2-Hydroxy-ethyl)-piperazino	119
21	Isopropyl	2-Pyridyl	Benzyl-amino	150
22	Isopropyl	2-Pyrazinyl	Thiomorpholino	107

Bsp. Nr.	R <sup>4</sup>	R <sup>3</sup>	R <sup>1</sup> R <sup>2</sup> N	Schmp. (°C)
23	Isopropyl	4-Methyl-phenyl	(3-Methoxy-propyl)-amino	Öl
24	Isopropyl	4-Methyl-phenyl	Cyclopentyl-amino	66
25	Isopropyl	4-Methyl-phenyl	(trans-4-Hydroxy-cyclohexyl)-amino	Öl
26	Isopropyl	4-Chlor-phenyl	(3-Methoxy-propyl)-amino	Öl
27	Isopropyl	4-Chlor-phenyl	4-Methyl-piperazino	292 (2HCl)
28	Isopropyl	4-Chlor-phenyl	Piperidino	75
29	Isopropyl	4-Chlor-phenyl	Pyrrolidino	215 (HCl)
30	Isopropyl	4-Chlor-phenyl	Thiomorpholino	215 (HCl)
31	Isopropyl	4-Chlor-phenyl	(2-(3-Methoxy-phenyl)-ethyl)-amino	213 (HCl)
32	Isopropyl	4-Chlor-phenyl	Butyl-amino	Öl
33	Isopropyl	4-Chlor-phenyl	Di-ethyl-amino	Öl
34	Isopropyl	4-Chlor-phenyl	Di-butyl-amino	165 (HCl)
35	Isopropyl	4-Chlor-phenyl	Di-propyl-amino	176 (HCl)

Bsp. Nr.	R <sup>4</sup>	R <sup>3</sup>	R <sup>1</sup> R <sup>2</sup> N	Schmp. (°C)
36	Isopropyl	4-Chlor-phenyl	Di-allyl-amino	118
37	Isopropyl	4-Chlor-phenyl	Di-(2-methoxy-ethyl)-amino	127 (HCl)
38	Isopropyl	4-Chlor-phenyl	Perhydroazepin-1-yl	68
39	Isopropyl	4-Chlor-phenyl	Benzyl-amino	108
40	Isopropyl	4-Chlor-phenyl	(2-Methoxy-ethyl)-amino	152 (HCl)
41	Isopropyl	4-Chlor-phenyl	(2-Ethylmercapto-ethyl)-amino	148 (HCl)
42	Isopropyl	4-Chlor-phenyl	(3-Morpholino-propyl)-amino	245 (2HCl)
43	Isopropyl	4-Chlor-phenyl	N-(Ethyl)-N-(benzyl)-amino	Öl
44	Isopropyl	4-Chlor-phenyl	4-Aminocarbonyl-piperidino	189
45	Isopropyl	4-Chlor-phenyl	1,3-Thiazolidin-3-yl	77
46	Isopropyl	4-Chlor-phenyl	4-(Dimethylamino-sulfonyl)-piperazino	150
47	Isopropyl	4-Chlor-phenyl	4-Benzyl-piperazino	265 (2HCl)
48	Isopropyl	4-Chlor-phenyl	4-((Isopropylamino-carbonyl)-methyl)-piperazino	133
49	tert-Butyl	4-Chlor-phenyl	4-Methyl-piperazino	122

Bsp. Nr.	R <sup>4</sup>	R <sup>3</sup>	R <sup>1</sup> R <sup>2</sup> N	Schmp. (°C)
50	tert-Butyl	4-Chlor-phenyl	(2-Methoxy-ethyl)-amino	94
51	tert-Butyl	4-Chlor-phenyl	(3-Pyridyl-methyl)-amino	143
52	tert-Butyl	4-Chlor-phenyl	Morpholino	136
53	tert-Butyl	4-Chlor-phenyl	4-(Dimethylamino-sulfonyl)-piperazino	168
54	tert-Butyl	4-Chlor-phenyl	(2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-4-yl)-amino	142
55	Phenyl	4-Chlor-phenyl	Morpholino	193
56	Phenyl	4-Chlor-phenyl	4-Methyl-piperazino	167
57	Phenyl	4-Chlor-phenyl	(3-Pyridyl-methyl)-amino	130
58	Phenyl	4-Chlor-phenyl	(3-(Imidazol-1-yl)-propyl)-amino	154
59	Phenyl	4-Chlor-phenyl	(2-(3-Methoxy-phenyl)-ethyl)-amino	103 (HCl)
60	Phenyl	4-Chlor-phenyl	4-Carboxy-1,3-thiazolidin-3-yl	113
61	Isopropyl	2-Thienyl	Pyrrolidino	74
62	Isopropyl	2-Thienyl	cis-2,6-Dimethyl-morpholino	103
63	Phenyl	4-Chlor-phenyl	Di-ethyl-amino	132
64	Phenyl	4-Chlor-phenyl	Butyl-amino	95 (HCl)

Bsp.	R <sup>4</sup>	R <sup>3</sup>	R <sup>1</sup> R <sup>2</sup> N	Schmp. (°C)
Nr.				
65	Phenyl	4-Chlor-phenyl	Thiomorpholino	175
66	tert-Butyl	4-Chlor-phenyl	Thiomorpholino	119
67	Isopropyl	4-Pyridyl	Butyl-amino	101
68	Isopropyl	4-Pyridyl	(3-Phenyl-propyl)-amino	Harz
69	Phenyl	4-Chlor-phenyl	Di-propyl-amino	72
70	Isopropyl	4-Chlor-phenyl	Cyclopropyl-amino	Öl
71	CF <sub>3</sub>	4-Chlor-phenyl	(3-Pyridyl-methyl)-amino	181
72	Isopropyl	4-Chlor-phenyl	3,3-Dimethyl-piperidino	Öl
73	CF <sub>3</sub>	4-Chlor-phenyl	4-Methyl-piperazino	108
74	CF <sub>3</sub>	4-Chlor-phenyl	Morpholino	184
75	tert-Butyl	4-Chlor-phenyl	Perhydroazepin-1-yl	151
76	tert-Butyl	4-Chlor-phenyl	4-Aminocarbonyl-piperidino	164
77	Isopropyl	3,5-Dichlor-phenyl	(trans-4-Hydroxy-cyclohexyl)-amino	174
78	Isopropyl	3,5-Dichlor-phenyl	(2-Hydroxy-ethyl)-amino	88
79	Isopropyl	3,5-Dichlor-phenyl	Butyl-amino	190 (HCl)

Bsp. Nr.	R <sup>4</sup>	R <sup>3</sup>	R <sup>1</sup> R <sup>2</sup> N	Schmp. (°C)
80	Isopropyl	3,5-Dichlor-phenyl	Di-ethyl-amino	Öl
81	Isopropyl	3,5-Dichlor-phenyl	Morpholino	138
82	Isopropyl	3,5-Dichlor-phenyl	Thiomorpholino	130
83	Isopropyl	3,5-Dichlor-phenyl	4-Methyl-piperazino	123
84	Isopropyl	3,5-Dichlor-phenyl	Di-propyl-amino	Öl
85	Isopropyl	4-Methyl-phenyl	Di-propyl-amino	Öl
86	Isopropyl	4-Methyl-phenyl	Di-ethyl-amino	180 (HCl)
87	Isopropyl	4-Methyl-phenyl	(3-Hydroxy-propyl)-amino	86
88	Isopropyl	4-Methyl-phenyl	Butyl-amino	Öl
89	Isopropyl	4-Methyl-phenyl	Morpholino	95
90	Isopropyl	4-Methyl-phenyl	Thiomorpholino	107
91	Isopropyl	4-Methyl-phenyl	4-Methyl-piperazino	70
92	Isopropyl	4-Chlor-phenyl	N-(Ethyl)-N-(butyl)-amino	Öl
93	Isopropyl	4-Chlor-phenyl	N-(Methyl)-N-(butyl)-amino	Öl

Bsp. Nr.	R <sup>4</sup>	R <sup>3</sup>	R <sup>1</sup> R <sup>2</sup> N	Schmp. (°C)
94	Isopropyl	4-Chlor-phenyl	4-(2-Pyridyl)-piperazino	166
95	CF <sub>3</sub>	4-Chlor-phenyl	4-(2-Pyridyl)-piperazino	174
96	Isopropyl	4-Chlor-phenyl	cis/trans-2,6-Dimethyl-morpholino	Öl
97	Isopropyl	4-Methyl-phenyl	cis-2,6-Dimethyl-morpholino	Öl
98	Isopropyl	4-Methyl-phenyl	Di-(2-methoxy-ethyl)-amino	Öl
99	Isopropyl	4-Methyl-phenyl	4-Aminocarbonyl-piperidino	192
100	Isopropyl	4-Methyl-phenyl	Perhydroazepin-1-yl	Öl
101	tert-Butyl	4-Chlor-phenyl	cis-2,6-Dimethyl-morpholino	117
102	tert-Butyl	4-Chlor-phenyl	(3-Methoxy-propyl)-amino	Öl
103	tert-Butyl	4-Chlor-phenyl	Di-(2-methoxy-ethyl)-amino	Öl
104	Isopropyl	4-Chlor-phenyl	cis-2,6-Dimethyl-morpholino	114
105	Isopropyl	4-Chlor-phenyl	(2-Diisopropylamino-ethyl)-amino	219 (2HCl)
106	Isopropyl	4-Chlor-phenyl	4-(2-Hydroxy-ethyl)-piperazino	227 (2HCl)
107	Isopropyl	4-Chlor-phenyl	(1-Benzyl-piperidin-4-yl)-amino	250 (2HCl)

Bsp. Nr.	R <sup>4</sup>	R <sup>3</sup>	R <sup>1</sup> R <sup>2</sup> N	Schmp. (°C)
108	Phenyl	4-Chlor-phenyl	cis/trans-2,6-Dimethyl-morpholino	187
109	Phenyl	4-Chlor-phenyl	(3-Methoxy-propyl)-amino	Öl
110	Phenyl	4-Chlor-phenyl	Di-(2-methoxy-ethyl)-amino	Öl
111	Phenyl	4-Chlor-phenyl	4-Aminocarbonyl-piperidino	204
112	Phenyl	4-Chlor-phenyl	Perhydroazepin-1-yl	126
113	Isopropyl	4-Cyan-phenyl	(4-Hydroxy-butyl)-amino	93
114	Isopropyl	4-Cyan-phenyl	(3-Methoxy-propyl)-amino	70
115	Isopropyl	4-Cyan-phenyl	Butyl-amino	89
116	Isopropyl	4-Cyan-phenyl	Cyclopentyl-amino	141
117	Isopropyl	4-Cyan-phenyl	(4-Hydroxy-cyclohexyl)-amino	101
118	Isopropyl	4-Cyan-phenyl	(3-Pyridyl-methyl)-amino	149
119	Isopropyl	4-Cyan-phenyl	Di-propyl-amino	80
120	Isopropyl	4-Cyan-phenyl	Perhydroazepin-1-yl	117
121	Isopropyl	4-Cyan-phenyl	Morpholino	224

Bsp. Nr.	R <sup>4</sup>	R <sup>3</sup>	R <sup>1</sup> R <sup>2</sup> N	Schmp. (°C)
122	Isopropyl	4-Cyan-phenyl	4-Methyl-piperazino	152
123	Isopropyl	2-Methyl-thiazol-4-yl	Di-propyl-amino	Öl
124	Isopropyl	4-Chlor-phenyl	Cyclopentyl-amino	82
125	Isopropyl	4-Chlor-phenyl	(trans-4-Hydroxy-cyclohexyl)-amino	138
126	Isopropyl	4-Chlor-phenyl	(trans-4-Amino-cyclohexyl)-amino	128
127	Isopropyl	4-Chlor-phenyl	(cis/trans-4-Hydroxy-cyclohexyl)-amino	Öl
128	Isopropyl	4-Chlor-phenyl	(4-Methyl-cyclohexyl)-amino	Öl
129	Isopropyl	4-Chlor-phenyl	N-(Cyclohexyl)-N-(methyl)-amino	88
130	Isopropyl	4-Chlor-phenyl	(2-Isopropyl-5-methyl-cyclohexyl)-amino	Öl
131	Isopropyl	4-Chlor-phenyl	(trans-2-Hydroxy-cyclohexyl)-amino	Öl
132	tert-Butyl	4-Chlor-phenyl	Cyclopentyl-amino	89
133	tert-Butyl	4-Chlor-phenyl	(trans-4-Hydroxy-cyclohexyl)-amino	173
134	CF <sub>3</sub>	4-Chlor-phenyl	Cyclopentyl-amino	99
135	Phenyl	4-Chlor-phenyl	(trans-4-Hydroxy-cyclohexyl)-amino	95

Bsp. Nr.	R <sup>4</sup>	R <sup>3</sup>	R <sup>1</sup> R <sup>2</sup> N	Schmp. (°C)
136	Isopropyl	4-Chlor-phenyl	4-Hydroxy-piperidino	121
137	Isopropyl	4-Chlor-phenyl	(4-Hydroxy-butyl)-amino	Öl
138	Isopropyl	4-Chlor-phenyl	(Benzimidazol-2-yl-methyl)-amino	112
139	Isopropyl	4-Chlor-phenyl	Cyclobutyl-amino	70
140	Isopropyl	4-Chlor-phenyl	Cyclononyl-amino	Öl
141	Isopropyl	4-Chlor-phenyl	3-Diethylaminocarbonyl-piperidino	Öl
142	Isopropyl	4-Chlor-phenyl	((R)-1-Phenyl-ethyl)-amino	Öl
143	Isopropyl	4-Chlor-phenyl	((S)-1-Phenyl-ethyl)-amino	Öl

## Beispiel 144

2-(4-Chlorphenyl)-6-isopropyl-4-(1-oxo-thiomorpholino)-pyrimidin

5 0.25 g 2-(4-Chlorphenyl)-6-isopropyl-4-thiomorpholino-pyrimidin wurden in 1 ml Eisessig gelöst und mit 0.068 ml einer 35 %igen Wasserstoffperoxidlösung versetzt. Nach 2 Stunden wurde mit 20 ml Wasser verdünnt und das Produkt mit Ethylacetat extrahiert. Die Ethylacetatphase wurde zweimal mit 10 ml Wasser ausgeschüttelt und die organische Phase nach dem Trocknen über Natriumsulfat eingeengt. Der

10 Rückstand wurde aus Isopropanol umkristallisiert. Ausbeute: 0.18 g.

Schmp.: 171°C

Analog wurden die folgenden Sulfoxide und Sulfone hergestellt:

Beispiel 145

5 2-(4-Chlorphenyl)-6-isopropyl-4-(1,1-dioxo-thiomorpholino)-pyrimidin; Schmp.:  
226°C

Beispiel 146

10 2-(4-Chlorphenyl)-6-isopropyl-4-(1-oxo-1,3-thiazolidin-1-yl)-pyrimidin; Schmp.:  
128°C

Beispiel 147

15 2-(4-Chlorphenyl)-4-((2-ethylsulfinyl-ethyl)-amino)-6-isopropyl-pyrimidin; Schmp.:  
103°C

15

Beispiel 148

6-Isopropyl-2-(4-methylphenyl)-4-(1-oxo-thiomorpholino)-pyrimidin; Schmp.: 152°C

Beispiel 149

20 2-(3,5-Dichlor-phenyl)-6-isopropyl-4-(1-oxo-thiomorpholino)-pyrimidin; Schmp.:  
187°C

Pharmakologische Untersuchungen

25

Aktivierung der löslichen Guanylatcyclase

Die Aktivierung der löslichen Guanylatcyclase (sGC), die die Umwandlung von Guanosintriphosphat (GTP) in cyclisches Guanosinmonophosphat (cGMP) und

30 Pyrophosphat katalysiert, durch die erfindungsgemäßen Verbindungen wurde mit Hilfe eines Enzym-Immuno-Assays (EIA) der Firma Amersham quantifiziert. Dazu

wurden die Prüfsubstanzen zunächst mit sGC in Mikrotiterplatten inkubiert und dann die Menge des entstandenen cGMP bestimmt.

Die eingesetzte sGC war aus Rinderlunge isoliert worden (siehe Methods in

5 Enzymology, Band 195, S. 377). Die Testlösungen (100 µl pro well) enthielten 50 mM Triethanolamin(TEA)-Puffer (pH 7.5), 3 mM MgCl<sub>2</sub>, 3 mM reduziertes Glutathion (GSH), 0.1 mM GTP, 1 mM 3-Isobutyl-1-methylxanthin (IBMX), geeignet verdünnte Enzymlösung sowie die Prüfsubstanz bzw. bei den Kontrollversuchen Lösungsmittel.

10 Die Prüfsubstanzen wurden in Dimethylsulfoxid (DMSO) gelöst und die Lösung mit DMSO/Wasser verdünnt, so daß die Endkonzentration c an Prüfsubstanz im Testansatz 50 µM betrug. Die DMSO-Konzentration im Testansatz betrug 5 % (v/v).

Die Reaktion wurde durch Zugabe der sGC gestartet. Der Reaktionsmix wurde für 15 bis 20 Minuten bei 37°C inkubiert und dann durch Eiskühlung und Zugabe des Stop-Reagenz (50 mM EDTA, pH 8.0) gestoppt. Ein Aliquot von 50 µl wurde

15 entnommen und zur Bestimmung des cGMP-Gehaltes mit dem Acetylierungs-Protokoll des Amersham-cGMP-EIA-Kits eingesetzt. Die Absorption der Proben wurde bei 450 nm (Referenz Wellenlänge 620 nm) in einem Mikrotiterplatten-Lesegerät gemessen. Die cGMP-Konzentration wurde über eine Eichkurve ermittelt, die unter denselben Versuchsbedingungen erhalten wurde. Die Aktivierung der sGC

20 durch eine Prüfsubstanz wird angegeben als n-fache Stimulation der basalen Enzymaktivität, die bei den Kontrollversuchen (mit Lösungsmittel statt Prüfsubstanz) gefunden wurde (berechnet nach der Formel

$$\text{n-fache Stimulierung} = [\text{cGMP}]_{\text{Prüfsubstanz}} / [\text{cGMP}]_{\text{Kontrolle}}.$$

25 Es wurden folgende Ergebnisse erhalten:

Verbindung des Beispiels Nr.	n-fache Stimulation bei c = 50 µM
---------------------------------	--------------------------------------

Verbindung des      n-fache Stimulation  
Beispiels Nr.      bei  $c = 50 \mu\text{M}$

25	28
29	>4
30	>4
32	>4
33	>16
34	>4
35	>16
36	>8
38	>8
43	>4
44	>4
45	>4
52	>8
63	>8
66	>4
69	>4
77	30
79	>4
80	>16
81	>4
82	>4
84	>16
85	>16
86	>16
88	>8
89	>8
90	>16


Verbindung des      n-fache Stimulation  
Beispiels Nr.      bei c = 50  $\mu$ M

97	>16
98	>8
99	>4
100	>8
112	>8
124	>16
125	32
133	>16
137	>16

## Patentansprüche

## 1. Verbindungen der Formel I,

5



in der

R<sup>1</sup> für (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl, das durch einen oder mehrere gleiche oder verschiedene

10 Substituenten aus der Reihe Hydroxy, (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkoxy, (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkyl-S(O)<sub>m</sub>-, R<sup>5</sup>R<sup>6</sup>N und Aryl substituiert sein kann, (C<sub>3</sub>-C<sub>9</sub>)-Cycloalkyl, das durch einen oder mehrere gleiche oder verschiedene Substituenten aus der Reihe (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkyl, Hydroxy und Amino substituiert sein kann, oder den Rest eines 5-gliedrigen bis 7-gliedrigen gesättigten heterocyclischen Ringes, der ein oder zwei gleiche oder verschiedene

15 Hetero-Ringglieder aus der Reihe O, NR<sup>7</sup> und S(O)<sub>m</sub> enthält und der durch einen oder mehrere gleiche oder verschiedene Substituenten aus der Reihe (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkyl und Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-alkyl- substituiert sein kann, steht;

und

R<sup>2</sup> für Wasserstoff, (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl, das durch einen oder mehrere gleiche oder

20 verschiedene Substituenten aus der Reihe Hydroxy, (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkoxy, (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkyl-S(O)<sub>m</sub>-, R<sup>5</sup>R<sup>6</sup>N und Aryl substituiert sein kann, (C<sub>3</sub>-C<sub>9</sub>)-Cycloalkyl, das durch einen oder mehrere gleiche oder verschiedene Substituenten aus der Reihe (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkyl, Hydroxy und Amino substituiert sein kann, oder den Rest eines 5-gliedrigen bis 7-gliedrigen gesättigten heterocyclischen Ringes, der ein oder zwei gleiche oder

25 verschiedene Hetero-Ringglieder aus der Reihe O, NR<sup>7</sup> und S(O)<sub>m</sub> enthält und der

durch einen oder mehrere gleiche oder verschiedene Substituenten aus der Reihe (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkyl und Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-alkyl- substituiert sein kann, steht;

oder

R<sup>1</sup>R<sup>2</sup>N für einen über ein Ringstickstoffatom gebundenen Rest eines 5-gliedrigen bis 5 7-gliedrigen gesättigten heterocyclischen Ringes steht, der neben dem die Reste R<sup>1</sup> und R<sup>2</sup> tragenden Stickstoffatom ein weiteres Hetero-Ringglied aus der Reihe O, NR<sup>7</sup> und S(O)<sub>m</sub> enthalten kann und der durch einen oder mehrere gleiche oder verschiedene Substituenten aus der Reihe (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkyl, Hydroxy, (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkoxy, R<sup>8</sup>R<sup>9</sup>N, Hydroxycarbonyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkoxycarbonyl und R<sup>8</sup>R<sup>9</sup>N-CO- substituiert sein

10 kann;

R<sup>3</sup> für Aryl steht;

R<sup>4</sup> für (C<sub>2</sub>-C<sub>5</sub>)-Alkyl, Trifluormethyl oder Aryl steht;

15 R<sup>5</sup> und R<sup>6</sup> für gleiche oder verschiedene Reste aus der Reihe Wasserstoff und (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkyl stehen oder die Gruppe R<sup>5</sup>R<sup>6</sup>N für einen über ein Ringstickstoffatom gebundenen Rest eines 5-gliedrigen bis 7-gliedrigen gesättigten oder ungesättigten heterocyclischen Ringes steht, der neben dem die Reste R<sup>5</sup> und R<sup>6</sup> tragenden

20 Stickstoffatom als weiteres Hetero-Ringglied noch ein Sauerstoffatom, eine Gruppe S(O)<sub>m</sub> oder ein Stickstoffatom enthalten kann und der an Ringkohlenstoffatomen einen oder mehrere gleiche oder verschiedene Substituenten aus der Reihe (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkyl, Hydroxy und Amino tragen kann und an einem Ringstickstoffatom einen Rest R<sup>7</sup> tragen kann;

25 R<sup>7</sup> für Wasserstoff, (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkyl, Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-alkyl-, Hydroxy-(C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-alkyl-, Hydroxycarbonyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-alkyl-, ((C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkoxycarbonyl)-(C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-alkyl-, R<sup>8</sup>R<sup>9</sup>N-CO-(C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-alkyl-, R<sup>10</sup>-SO<sub>2</sub>- oder Aryl steht, wobei R<sup>7</sup> dann, wenn diese Gruppe an einem für R<sup>1</sup>R<sup>2</sup>N stehenden Piperazinorest steht, nicht für

30 carbocyclisches Aryl oder carbocyclisches Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-alkyl- stehen kann;

$R^8$  und  $R^9$  für gleiche oder verschiedene Reste aus der Reihe Wasserstoff und ( $C_1$ - $C_4$ )-Alkyl stehen;

$R^{10}$  für ( $C_1$ - $C_4$ )-Alkyl, Aryl oder  $R^8R^9N$  steht;

5

Aryl für Phenyl, Naphthyl oder Heteroaryl steht, die alle durch einen oder mehrere gleiche oder verschiedene Substituenten aus der Reihe Halogen, ( $C_1$ - $C_4$ )-Alkyl, Phenyl,  $CF_3$ ,  $NO_2$ , OH, -O-( $C_1$ - $C_4$ )-Alkyl, -O-( $C_2$ - $C_4$ )-Alkyl-O-( $C_1$ - $C_4$ )-Alkyl, ( $C_1$ - $C_2$ )-Alkylendioxy,  $NH_2$ , -NH-( $C_1$ - $C_4$ )-Alkyl, -N(( $C_1$ - $C_4$ )-Alkyl)<sub>2</sub>, -NH-CHO, -NH-CO-( $C_1$ - $C_4$ )-

10 Alkyl, -CN, -CO-NH<sub>2</sub>, -CO-NH-( $C_1$ - $C_4$ )-Alkyl, -CO-N(( $C_1$ - $C_4$ )-Alkyl)<sub>2</sub>, -CO-OH, -CO-O-( $C_1$ - $C_4$ )-Alkyl, -CHO und -CO-( $C_1$ - $C_4$ )-Alkyl substituiert sein können;

Heteroaryl für den Rest eines monocyclischen 5-gliedrigen oder 6-gliedrigen aromatischen Heterocyclus oder eines bicyclischen 8-gliedrigen bis 10-gliedrigen

15 aromatischen Heterocyclus steht, die jeweils ein oder mehrere gleiche oder verschiedene Ringheteroatome aus der Reihe N, O und S enthalten;

m für 0, 1 oder 2 steht;

20 in allen ihren stereoisomeren Formen und Mischungen davon in allen Verhältnissen, und ihre physiologisch verträglichen Salze,

wobei Verbindungen der Formel I ausgeschlossen sind, in denen gleichzeitig  $R^4$  für tert-Butyl oder Trifluormethyl steht,  $R^3$  für Phenyl steht, das durch einen oder zwei

25 gleiche oder verschiedene Substituenten aus der Reihe Halogen, OH, -O-R<sup>11</sup> und  $CF_3$  substituiert sein kann,  $R^1R^2N$  für  $R^{11}$ -NH-, ( $R^{11}$ )<sub>2</sub>N- oder  $R^{12}R^{13}N-(CH_2)_p-NH-$  steht, p für 2 oder 3 steht,  $R^{11}$  für gesättigtes unsubstituiertes ( $C_1$ - $C_4$ )-Alkyl steht und  $R^{12}$  und  $R^{13}$  für gleiche oder verschiedene Reste aus der Reihe Wasserstoff und  $R^{11}$  stehen oder die Gruppe  $R^{12}R^{13}N$  für einen über ein Ringstickstoffatom gebundenen

30 Rest eines 5-gliedrigen oder 6-gliedrigen gesättigten heterocyclischen Ringes steht, der neben dem die Reste  $R^{12}$  und  $R^{13}$  tragenden Stickstoffatom als weiteres Hetero-

Ringglied noch ein Sauerstoffatom, ein Schwefelatom oder ein Stickstoffatom enthalten kann und der durch einen Arylrest oder durch einen Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-alkylrest substituiert sein kann, wobei die Arylgruppe durch einen oder zwei gleiche oder verschiedene Substituenten aus der Reihe Halogen, OH, -O-R<sup>11</sup> und CF<sub>3</sub> substituiert 5 sein kann.

2. Verbindungen der Formel I gemäß Anspruch 1, worin R<sup>1</sup> für (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl, das durch einen oder mehrere gleiche oder verschiedene Substituenten aus der Reihe Hydroxy, (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkoxy, (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkyl-S(O)<sub>m</sub>-, R<sup>5</sup>R<sup>6</sup>N 10 und Aryl substituiert sein kann, oder für (C<sub>3</sub>-C<sub>9</sub>)-Cycloalkyl, das durch einen oder mehrere gleiche oder verschiedene Substituenten aus der Reihe (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkyl, Hydroxy und Amino substituiert sein kann, steht; und R<sup>2</sup> für Wasserstoff, (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl, das durch einen oder mehrere gleiche oder verschiedene Substituenten aus der Reihe Hydroxy, (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkoxy, (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)- 15 Alkyl-S(O)<sub>m</sub>-, R<sup>5</sup>R<sup>6</sup>N und Aryl substituiert sein kann, oder für (C<sub>3</sub>-C<sub>9</sub>)-Cycloalkyl, das durch einen oder mehrere gleiche oder verschiedene Substituenten aus der Reihe (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkyl, Hydroxy und Amino substituiert sein kann, steht; oder R<sup>1</sup>R<sup>2</sup>N für einen über ein Ringstickstoffatom gebundenen Rest eines 5-gliedrigen, 6-gliedrigen oder 7-gliedrigen gesättigten heterocyclischen Ringes steht, der neben 20 dem die Reste R<sup>1</sup> und R<sup>2</sup> tragenden Stickstoffatom als weiteres Hetero-Ringglied noch ein Sauerstoffatom, eine Gruppe S(O)<sub>m</sub> oder ein einen Rest R<sup>7</sup> tragendes Stickstoffatom enthalten kann und der durch einen oder mehrere gleiche oder verschiedene Substituenten aus der Reihe (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkyl, Hydroxy, (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkoxy, R<sup>8</sup>R<sup>9</sup>N, Hydroxycarbonyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkoxycarbonyl und R<sup>8</sup>R<sup>9</sup>N-CO- substituiert sein 25 kann; in allen ihren stereoisomeren Formen und Mischungen davon in allen Verhältnissen, und ihre physiologisch verträglichen Salze.

3. Verbindungen der Formel I gemäß Anspruch 1 und/oder 2, worin, R<sup>1</sup> für (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkyl, das durch einen oder mehrere gleiche oder verschiedene 30 Substituenten aus der Reihe Hydroxy, (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkoxy, (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkyl-S(O)<sub>m</sub>-, R<sup>5</sup>R<sup>6</sup>N

und Aryl substituiert sein kann, oder für (C<sub>3</sub>-C<sub>9</sub>)-Cycloalkyl, das durch einen oder mehrere gleiche oder verschiedene Substituenten aus der Reihe (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkyl, Hydroxy und Amino substituiert sein kann, steht, und R<sup>2</sup> für Wasserstoff steht, oder R<sup>1</sup> und R<sup>2</sup> für gleiches oder verschiedenes (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkyl stehen, das durch einen

5 oder mehrere gleiche oder verschiedene Substituenten aus der Reihe Hydroxy, (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkoxy, (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkyl-S(O)<sub>m</sub>-, R<sup>5</sup>R<sup>6</sup>N und Aryl substituiert sein kann; in allen ihren stereoisomeren Formen und Mischungen davon in allen Verhältnissen, und ihre physiologisch verträglichen Salze.

10 4. Verbindungen der Formel I gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 3, worin R<sup>1</sup> für (C<sub>3</sub>-C<sub>9</sub>)-Cycloalkyl, das durch einen oder mehrere gleiche oder verschiedene Substituenten aus der Reihe (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkyl, Hydroxy und Amino substituiert sein kann, steht, und R<sup>2</sup> für Wasserstoff steht; in allen ihren stereoisomeren Formen und Mischungen davon in allen Verhältnissen,

15 und ihre physiologisch verträglichen Salze.

5. Verbindungen der Formel I gemäß Anspruch 1 und/oder 2, worin R<sup>1</sup>R<sup>2</sup>N für einen unsubstituierten oder substituierten Rest aus der Reihe Piperidino, Morpholino, Thiomorpholino (und dessen S-Oxid und S,S-Dioxid) und Piperazino steht; in allen

20 ihren stereoisomeren Formen und Mischungen davon in allen Verhältnissen, und ihre physiologisch verträglichen Salze.


6. Verbindungen der Formel I gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 5, worin R<sup>3</sup> für substituiertes Phenyl steht; in allen ihren stereoisomeren Formen und

25 Mischungen davon in allen Verhältnissen, und ihre physiologisch verträglichen Salze.

7. Verbindungen der Formel I gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 6, worin R<sup>4</sup> für (C<sub>3</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkyl steht; in allen ihren stereoisomeren Formen und

30 Mischungen davon in allen Verhältnissen, und ihre physiologisch verträglichen Salze.

8. Verfahren zur Herstellung von Verbindungen der Formel I gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß ein 4-Hydroxypyrimidin der Formel IV aktiviert wird und dann mit einem Amin der Formel 5 VI umgesetzt wird,



wobei R<sup>1</sup>, R<sup>2</sup>, R<sup>3</sup> und R<sup>4</sup> die in den Ansprüchen 1 bis 7 angegebenen Bedeutungen 10 haben.

9. Verbindungen der Formel I gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 7 und/oder ihre physiologisch verträglichen Salze zur Verwendung als Arzneimittel.

15 10. Pharmazeutisches Präparat, dadurch gekennzeichnet, daß es eine oder mehrere Verbindungen der Formel I gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 7 und/oder ihre physiologisch verträglichen Salze und einen pharmazeutisch verträglichen Träger enthält.

20 11. Verbindungen der Formel I gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 7 und/oder ihre physiologisch verträglichen Salze zur Verwendung als Aktivatoren der löslichen Guanylatcyclase.

12. Verbindungen der Formel I gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 7 und/oder ihre physiologisch verträglichen Salze zur Verwendung in der Therapie oder Prophylaxe von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, endothelialer Dysfunktion,  
5 diastolischer Dysfunktion, Atherosklerose, Bluthochdruck, Angina pectoris, Thrombosen, Restenosen, Myocardinfarkt, Schlaganfällen, Herzinsuffizienz, Pulmonalhypertonie, erektiler Dysfunktion, Asthma bronchiale, chronischer Niereninsuffizienz, Diabetes oder Leberzirrhose oder zur Verbesserung einer eingeschränkten Lernfähigkeit oder Gedächtnisleistung.

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Int'l. Application No  
PCT/EP 99/05636

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER					
IPC 7	C07D401/12	C07D401/04	C07D403/04	C07D417/04	C07D403/12

A61K31/505    A61K31/506    A61P9/10    A61P13/12    A61P11/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 C07D A61K A61P

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
P, A	DE 197 44 027 A (HOECHST MARION ROUSSEL DE GMBH) 8 April 1999 (1999-04-08) cited in the application the whole document	1-12
P, A	DE 197 56 388 A (HOECHST MARION ROUSSEL DE GMBH) 24 June 1999 (1999-06-24) cited in the application the whole document	1-12
P, A	EP 0 908 456 A (HOECHST MARION ROUSSEL DE GMBH) 14 April 1999 (1999-04-14) cited in the application the whole document	1-12
-/-		

Further documents are listed in the continuation of box C.

Patent family members are listed in annex.

### Special categories of cited documents :

- \*A\* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- \*E\* earlier document but published on or after the international filing date
- \*L\* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- \*O\* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- \*P\* document published prior to the International filing date but later than the priority date claimed

- \*T\* later document published after the International filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- \*X\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- \*Y\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- \*&\* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the International search

25 November 1999

Date of mailing of the International search report

10/12/1999

### Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl.  
Fax: (+31-70) 340-3016

### Authorized officer

Scruton-Evans, I

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Inte	lational Application No
PCT/EP 99/05636	

## C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	EP 0 055 693 A (CIBA GEIGY AG) 7 July 1982 (1982-07-07) cited in the application examples 24-29 ---	1-12
A	EP 0 555 478 A (NIPPON SHINYAKU CO LTD) 18 August 1993 (1993-08-18) cited in the application the whole document ---	1-12
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 18, no. 542 (C-1261), 17 October 1994 (1994-10-17) & JP 06 192252 A (NISSAN CHEM IND LTD), 12 July 1994 (1994-07-12) See all examples, in particular pages 9-13, Page 15/16, 29/30, 38-41 abstract ---	1-8
X	DE 40 34 762 A (HOECHST AG) 7 May 1992 (1992-05-07) See table 1, Nr 1,4,6-11,14,45 ---	1-8
X	NIKOLAENKOVA E B ET AL: "Synthesis of 4,6-bis(1H,1,2,3-triazolyl)pyrimidines by the reaction of 4,6-diazido-2-(methoxyphenyl)pyrimidine with compounds containing a reactive methylene group" CHEM. HETEROCYCL. COMPD. (N. Y.) (CHCCAL,00093122);1998; VOL.33 (8); PP.968-972, XP002123827 Russian Academy of Sciences; Novosibirsk Institute of Organic Chemistry, Siberian Branch; novosibirsk; 630090; Russia (RU) See Compound Nr VIa ---	1-8
P,A	WO 98 37079 A (MORRISSEY MICHAEL M ;PARADKAR VIDYADHAR MADHAV (US); DAVEY DAVID D) 27 August 1998 (1998-08-27) See Compounds of formula VIIb, VIIa the whole document ---	1-12

**INTERNATIONAL SEARCH REPORT**

Information on patent family members

International Application No

PCT/EP 99/05636

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)		Publication date
DE 19744027	A	08-04-1999	NONE		
DE 19756388	A	24-06-1999	AU 2270899 A	12-07-1999	
			WO 9932460 A	01-07-1999	
EP 0908456	A	14-04-1999	DE 19744026 A	08-04-1999	
			AU 8791298 A	22-04-1999	
			CA 2249542 A	06-04-1999	
			CN 1214339 A	21-04-1999	
			CZ 9803205 A	14-04-1999	
			PL 329042 A	12-04-1999	
EP 0055693	A	07-07-1982	AT 32065 T	15-02-1988	
			AU 558710 B	05-02-1987	
			AU 7884081 A	01-07-1982	
			BG 37221 A	15-04-1985	
			BR 8108383 A	13-10-1982	
			CA 1220953 A	28-04-1987	
			CS 8109672 A	15-08-1985	
			DD 202798 A	05-10-1983	
			DE 3176621 A	25-02-1988	
			DK 571281 A, B,	24-06-1982	
			ES 508254 A	01-11-1982	
			GR 76379 A	06-08-1984	
			IL 64612 A	30-09-1988	
			IN 159209 A	11-04-1987	
			LV 5152 A	10-10-1993	
			MX 6720 E	07-11-1985	
			NZ 199360 A	11-04-1986	
			OA 6972 A	31-07-1983	
			PH 19369 A	02-04-1986	
			PT 74181 A	02-01-1982	
			PT 74181 B	04-01-1985	
			RO 83451 A	21-02-1984	
			SU 1482505 A	23-05-1989	
			US 4493726 A	15-01-1985	
			US 4674229 A	23-06-1987	
			YU 305881 A	30-04-1984	
			ZW 30681 A	14-07-1982	
			JP 1634449 C	20-01-1992	
			JP 2053402 B	16-11-1990	
			JP 61246102 A	01-11-1986	
			JP 1417415 C	22-12-1987	
			JP 57131702 A	14-08-1982	
			JP 62025641 B	04-06-1987	
			LT 2607 R	25-03-1994	
			ZA 8108852 A	29-12-1982	
EP 0555478	A	18-08-1993	AU 8405991 A	30-03-1992	
			CA 2090027 A	01-03-1992	
			CN 1059908 A	01-04-1992	
			WO 9204333 A	19-03-1992	
			US 5589477 A	31-12-1996	
JP 06192252	A	12-07-1994	NONE		
DE 4034762	A	07-05-1992	NONE		

**INTERNATIONAL SEARCH REPORT**

Information on patent family members

International Application No

PCT/EP 99/05636

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
WO 9837079 A	27-08-1998	AU 6174998 A	09-09-1998

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 99/05636

A. KLASSEFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES  
 IPK 7 C07D401/12 C07D401/04 C07D403/04 C07D417/04 C07D403/12  
 A61K31/505 A61K31/506 A61P9/10 A61P13/12 A61P11/00

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

## B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 C07D A61K A61P

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der Internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

## C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
P, A	DE 197 44 027 A (HOECHST MARION ROUSSEL DE GMBH) 8. April 1999 (1999-04-08) in der Anmeldung erwähnt das ganze Dokument	1-12
P, A	DE 197 56 388 A (HOECHST MARION ROUSSEL DE GMBH) 24. Juni 1999 (1999-06-24) in der Anmeldung erwähnt das ganze Dokument	1-12
P, A	EP 0 908 456 A (HOECHST MARION ROUSSEL DE GMBH) 14. April 1999 (1999-04-14) in der Anmeldung erwähnt das ganze Dokument	1-12
		-/-

Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

Siehe Anhang Patentfamilie

\* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

\*A\* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

\*E\* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem Internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

\*L\* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

\*O\* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

\*P\* Veröffentlichung, die vor dem Internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

\*T\* Spätere Veröffentlichung, die nach dem Internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

\*X\* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

\*Y\* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

\*&\* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der Internationalen Recherche

Absendedatum des Internationalen Recherchenberichts

25. November 1999

10/12/1999

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl  
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Scruton-Evans, I

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 99/05636

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	EP 0 055 693 A (CIBA GEIGY AG) 7. Juli 1982 (1982-07-07) in der Anmeldung erwähnt Beispiele 24-29 ---	1-12
A	EP 0 555 478 A (NIPPON SHINYAKU CO LTD) 18. August 1993 (1993-08-18) in der Anmeldung erwähnt das ganze Dokument ---	1-12
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 18, no. 542 (C-1261), 17. Oktober 1994 (1994-10-17) & JP 06 192252 A (NISSAN CHEM IND LTD), 12. Juli 1994 (1994-07-12) siehe alle Beispiele, insbesondere Seiten 9-13, Seite 15/16, 29/30, 38-41 Zusammenfassung ---	1-8
X	DE 40 34 762 A (HOECHST AG) 7. Mai 1992 (1992-05-07) siehe Tabelle 1, Nr 1,4,6-11,14,45 ---	1-8
X	NIKOLAENKOVA E B ET AL: "Synthesis of 4,6-bis(1H,1,2,3-triazolyl)pyrimidines by the reaction of 4,6-diazido-2-(methoxyphenyl)pyrimidine with compounds containing a reactive methylene group" CHEM. HETEROCYCL. COMPD. (N. Y.) (CHCCAL, 00093122); 1998; VOL.33 (8); PP.968-972, XP002123827 Russian Academy of Sciences; Novosibirsk Institute of Organic Chemistry, Siberian Branch; novosibirsk; 630090; Russia (RU) siehe Verbindung Nr VIa ---	1-8
P,A	WO 98 37079 A (MORRISSEY MICHAEL M ;PARADKAR VIDYADHAR MADHAV (US); DAVEY DAVID D) 27. August 1998 (1998-08-27) siehe Verbindungen der Formel VIIb, VIIa das ganze Dokument ---	1-12

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 99/05636

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
DE 19744027 A	08-04-1999	KEINE		
DE 19756388 A	24-06-1999	AU 2270899 A WO 9932460 A		12-07-1999 01-07-1999
EP 0908456 A	14-04-1999	DE 19744026 A AU 8791298 A CA 2249542 A CN 1214339 A CZ 9803205 A PL 329042 A		08-04-1999 22-04-1999 06-04-1999 21-04-1999 14-04-1999 12-04-1999
EP 0055693 A	07-07-1982	AT 32065 T AU 558710 B AU 7884081 A BG 37221 A BR 8108383 A CA 1220953 A CS 8109672 A DD 202798 A DE 3176621 A DK 571281 A, B, ES 508254 A GR 76379 A IL 64612 A IN 159209 A LV 5152 A MX 6720 E NZ 199360 A OA 6972 A PH 19369 A PT 74181 A PT 74181 B RO 83451 A SU 1482505 A US 4493726 A US 4674229 A YU 305881 A ZW 30681 A JP 1634449 C JP 2053402 B JP 61246102 A JP 1417415 C JP 57131702 A JP 62025641 B LT 2607 R ZA 8108852 A		15-02-1988 05-02-1987 01-07-1982 15-04-1985 13-10-1982 28-04-1987 15-08-1985 05-10-1983 25-02-1988 24-06-1982 01-11-1982 06-08-1984 30-09-1988 11-04-1987 10-10-1993 07-11-1985 11-04-1986 31-07-1983 02-04-1986 02-01-1982 04-01-1985 21-02-1984 23-05-1989 15-01-1985 23-06-1987 30-04-1984 14-07-1982 20-01-1992 16-11-1990 01-11-1986 22-12-1987 14-08-1982 04-06-1987 25-03-1994 29-12-1982
EP 0555478 A	18-08-1993	AU 8405991 A CA 2090027 A CN 1059908 A WO 9204333 A US 5589477 A		30-03-1992 01-03-1992 01-04-1992 19-03-1992 31-12-1996
JP 06192252 A	12-07-1994	KEINE		
DE 4034762 A	07-05-1992	KEINE		

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 99/05636

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
WO 9837079 A	27-08-1998	AU 6174998 A	09-09-1998